

5 厘米，宽 2.2—2.5 厘米，扁平，无毛，腹缝翅宽 3—4 毫米，背缝翅宽约 1 毫米，通常有种子 1—2 粒。花期 4—6 月，果期 7—10 月。

产广东、广西。生于山地疏林或灌木丛中。越南也有分布。模式标本采自香港。

14. **边荚鱼藤** (植物分类学报) 纤毛萼鱼藤 (中国主要植物图说·豆科) 图版 62: 8

*Derris marginata* (Roxb.) Benth. in Journ. Soc. Bot. 4(Suppl.): 111. 1860; Baker in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 245. 1878; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 2: 453. 1916; How in Act. Phytotax. Sin. 3: 218. pl. 28, 3—4. 1954; 中国高等植物图鉴 2: 474. 图 2677. 1972. — *Dalbergia marginata* Roxb. Fl. Ind. 3: 241. 1824.

攀援状灌木；除花萼、子房被疏柔毛外全株无毛。羽状复叶长 13—25 厘米；小叶 2—3 对，近革质，倒卵状椭圆形或倒卵形，长 5—15 厘米，宽 2.5—6 厘米，先端短渐尖，钝头，基部圆形，侧脉 6—8 (—10) 对，两面稍隆起，下面较明显；小叶长约 5 毫米。圆锥花序腋生，长 6—20 厘米，无毛，分枝少数，花单生或 2—3 朵聚生；花长 10—12 毫米；花梗长 5—12 毫米；花萼浅杯状，长 2—3 毫米；花冠白色淡红色，无毛，旗瓣阔卵形；雄蕊单体；子房无柄。荚果薄，舌状长椭圆形，长 7—10 (—15) 厘米，宽 2—4 厘米，无毛，有小网纹，腹缝翅宽 6—8 毫米，背缝翅宽 2—3 毫米。花期 4—5 月，果期 11 月至翌年 1 月。

产福建、广东、广西、云南。生于山地疏林或密林中。印度、中南半岛也有分布。

K. Thothathri 在 Journ. Jap. Bot. 45: 1970 发表 *D. henryi* Thoth. 新种，以 Henry 10893 为模式。此号标本过去均鉴定为本种，编者仅见模式标本照片，根据描述除荚果与种子较长外，无其他明显区别，谨记于此留待进一步研究。

15. **疏花鱼藤** (植物分类学报)

*Derris laxiflora* Benth. in Journ. Linn. Bot. 4(Suppl.): 105. 1860; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 199. 1887; Hayata Ic. Pl. Formos. 1: 206. 1911; Kanehira, Formos. Trees ed. 2, 293. 1936; How in Act. Phytotax. Sin. 3: 215. pl. 27, 5—6. 1954; 台湾植物志 3: 253. 1977.

攀援状灌木；除花萼被疏柔毛外全体无毛。羽状复叶，小叶 2—3 对，近革质，长椭圆形，长 5—8 厘米，宽 2.5—4 厘米，先端钝，基部宽楔形，光亮，圆锥花序顶生，疏花，长 15—30 厘米，基部有一伸长分枝，其余小枝短；花长约 1.2 厘米；花梗长 6—8 毫米；花萼阔钟状；花冠白色，花瓣具柄，旗瓣近圆形，基部阔楔形；翼瓣和龙骨瓣基部有耳；雄蕊单体；子房有胚珠 4—5 粒。荚果长椭圆形，长约 8 厘米；宽 2—2.5 厘米，腹缝翅宽约 3 毫米，背缝翅较狭。

产台湾。散生于低海拔山地林中。模式标本采自恒春。

16. **掌叶鱼藤** (植物分类学报)

*Derris palmifolia* Chun et How in Act. Phytotax. Sin. 2: 68. 1952; How in