

Act. Phytotax. Sin. 3: 216. pl. 27, 9—10. 1954.

攀援状灌木；除花芽和幼枝外全部无毛。羽状复叶生于短枝上，小叶2对，紧接近掌状，连叶柄长5—7厘米；小叶小，卵状椭圆形至长椭圆形，下方1对最小，长2—3.5厘米，宽1.3—1.5厘米，其余的长4—5厘米，宽约1.5厘米，有时顶端1枚较大，先端短渐尖，基部楔形或稍近圆形，侧脉6—9对，极纤细。花未见。果序侧生，长于复叶2—3倍，阔圆锥花序式，分枝稀少，伸长，开展；荚果长椭圆状舌形，长4—7厘米，宽1.3—1.7厘米，顶端斜锐尖，基部圆形或截形，干时有网纹，腹缝翅宽约2毫米，背缝翅宽不及1毫米，种子单生或有时2粒，疏离；种子紫黑色，长约6毫米，宽约4毫米。果期9月。

产云南（巍山）。生于山地开旷峡谷中，海拔1700米。

17. 粉叶鱼藤（植物分类学报）

Derris glauca Merr. et Chun in Sunyatsenia 2: 246. pl. 50. 1935; Chun et How in Act. Phytotax. Sin. 2: 66. 1952; How, l. c. 3: 225. pl. 30, 10—12. 1954; 中国主要植物图说·豆科 596. 1955; 海南植物志 2: 294. 1965. — *Derris sp.* Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 96. 1927.

攀援状灌木。枝、芽有黄色柔毛，小枝变无毛或被极稀疏柔毛，有小瘤体。羽状复叶；小叶4—6对，膜质，倒卵状长圆形，长5—7厘米，宽2—3.5厘米，先端尾状渐尖，基部楔形或阔楔形；幼时下面绿白色，老时粉绿色。聚伞花序组成圆锥花序，长10—15厘米，径6—8厘米，花通常3朵聚生于长8—10毫米的短枝顶端；花长16—18毫米；花梗纤细，长8—10毫米；有小苞片2枚；花萼红褐色，阔杯状，径6—7毫米，边缘和口部有黄色柔毛；花冠玫瑰色，旗瓣阔卵形，长16—17毫米，宽约12毫米，先端2浅裂，近基部内侧有薄片状附属体2，翼瓣和龙骨瓣约与翼瓣等长，基部有耳；雄蕊单体；子房下部被黄色微柔毛，有胚珠4粒。荚果薄，长椭圆形或舌状，长4—8厘米，宽1.5—2.5厘米，顶端渐尖，基部渐狭或钝，腹缝翅宽3—4毫米，背缝翅宽1—2毫米，种子1—3粒。花期4—5月，果期7—8月。

产广东、海南、广西（十万大山）。多见于低海拔至中海拔的森林中。模式标本采自海南崖县。

18. 海南鱼藤（植物分类学报）

Derris hainanensis Hayata l.c. Pl. Formos. 3: 77. 1913; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 96. 1927; How. in Act. Phytotax. Sin. 3: 225. 1954; 中国主要植物图说·豆科 297. 1955; 海南植物志 2: 295. 1965.

木质藤本。枝圆柱状，无毛，散生椭圆形皮孔。羽状复叶；托叶长椭圆状三角形，先端钝，具短尖，外被稀疏柔毛；小叶6—7对，膜质，长4—7厘米，宽1.8—3.5厘米，先端尾状渐尖，基部楔形、阔楔形或有时近圆形，先端尾状渐尖，基部楔形、阔楔形或有时近圆形，两面无毛，下面苍黄稍带粉绿色；小叶柄长约5毫米；聚伞花序组成圆锥花