

米，种子1—4粒。花期4—5月。

广东、广西有栽培。印度、中南半岛、马来半岛有分布。

21. 粤东鱼藤 (植物分类学报) 韩氏鱼藤 图版 59: 10—11

*Derris hancei* Hemsl. in Curtis's Bot. Mag. 4: t. 8008. 1905, et in Kew Bull. Misc. Inf. 250, 1908; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. ser. 10: 86. 1912; Hand-Mazz. in Beih. Bot. Centralbl. 52: 159. 1934; How in Act. Phytotax. Sin. 3: 226. pl. 30, 13—15. 1954. — *D. oblonga* auct. non Benth.: Hance in Journ. Bot. 17: 10. 1879; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 199. 1887. — *D. elegans* auct. non Benth.: Merr. in Philip. Journ. Sci. 15: 241. 1915.

攀援状灌木。羽状复叶；小叶3—4对，稀2对，纸质，倒卵状长椭圆形，长5—9厘米，宽2—3.5厘米，先端短渐尖，钝头，基部楔形、阔楔形或稍带圆形，两面无毛，下面苍白色，中脉下面明显隆起，侧脉和细脉纤细不明显。总状花序腋生，狭窄，长7—12厘米，散生微柔毛；花梗纤细，长3—5毫米，顶端有小苞片2枚；花萼紫红色，顶端近截平，长和宽3—4毫米，外面无毛，内面近口部有一环柔毛；花冠白色，外面稍带红色，长10—12毫米；旗瓣近圆形，先端凹陷，基部内侧有薄片状小附属体2枚；子房被毛，有胚珠2粒。荚果斜卵形或长卵形，长2.5—4厘米，宽1.5—1.8厘米，无毛，老熟时有横脉纹，腹背两缝均有狭翅，翅宽1—1.5毫米，种子通常1粒，稀2粒。花期4—8月，果期7月至翌年1月。

产广东。生于旷野路旁及水塘边。模式标本采自肇庆。

22. 异翅鱼藤 (海南植物志) 马来鱼藤 (广西农业)

*Derris malaccensis* (Benth.) Prain in Journ. As. Soc. Beng. 66(2): 107. 1897; Ridley, Fl. Malay. Penins. 3: 589. 1922; How in Act. Phytotax. Sin. 3: 227. 1954; 海南植物志 2: 294. 1965. — *D. cuneifolia* Benth. var. *malaccensis* Benth. in Journ. Linn. Soc. Bot. 4(Suppl.): 112. 1860.

攀援状灌木，高10—15米；除花萼口部和子房被柔毛外全体无毛。羽状复叶长20—30厘米；小叶2—3（—4）对，近革质，椭圆形，长10—15厘米，先端尾状渐尖，基部圆形。总状花序短于复叶，花束轴常延伸成一小枝；花萼淡红色，钟状，长约3毫米，波状浅裂；花冠玫瑰红色、粉红色或白色，长13—14毫米，旗瓣圆形，先端截平或倒心形，基部内侧有小附属体2；雄蕊单体。荚果长椭圆形，长5—8厘米，腹背两缝均有翅，翅极不相等，背缝翅宽不及1毫米，种子1—4粒。

广东（广州）和海南有栽培。中南半岛、马亚西亚、印度尼西亚有分布。

23. 大叶鱼藤 (植物分类学报) 图版 63: 6—8

*Derris latifolia* Prain in Journ. As. Soc. Beng. 66(2): 107. 1879; How in Act. Phytotax. Sin. 3: 227. pl. 31, 5. 1954.

乔木。羽状复叶大形，长45—60厘米；小叶2—3对，厚纸质，卵状长椭圆形至卵状