

Journ. Asiat. Soc. Bengal 63(2): 184. 1874. non E. Meyer 1836 quae est *D. salicifolium* (Poir.) DC. — *D. kurzii* Craib in Kew Bull. 1911: 37. 1911. — *Phyllodium grande* (Kurz.) Schindl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 20: 270. 1924. — *P. kurzii* (Craib) Chun in Sunyatsenia 4: 213. 1940.

灌木，高 1—2 米。多分枝；分枝圆柱形，幼时密被灰黄色绒毛。托叶三角形，长约 4 毫米，基部宽 2 毫米，外面密被贴伏丝状毛；叶柄长 2—3 毫米，粗壮，密被灰黄色绒毛；小叶近革质或革质，顶生小叶卵形、圆卵形或椭圆形，长 7—16 厘米，宽 5—11 厘米，先端急尖或钝，基部钝圆或微心形，侧生小叶长 7—11 厘米，宽 5—6 厘米，基部偏斜，小叶上面被白色贴伏短柔毛，下面密被白色绒毛，侧脉每边 8—10 条，直达叶缘，在下面隆起，网脉两面明显；小托叶狭三角形，长 3—4 毫米，基部宽约 0.5 毫米；小叶柄长 1 毫米，被灰黄色绒毛。伞形花序有花 5—11 朵，藏于叶状苞片内，排成顶生总状圆锥花序状，叶状苞片宽椭圆形或宽卵形，长 2—3.5 厘米，宽 1.5—2.5 厘米，先端圆形或微缺；花梗长 5—10 毫米，被钩状毛；花萼长 2—3.5 毫米，具白色柔毛；花冠白色或淡黄色，旗瓣长约 10 毫米，宽约 5 毫米，具瓣柄，翼瓣长约 8 毫米，宽 1.5 毫米，具瓣柄，龙骨瓣长约 9 毫米，具长瓣柄，基部具耳；子房长 2.5—3 毫米，花柱细长，长约 10 毫米，近基部有柔毛。荚果长 1—2 厘米，宽 4—5 毫米，稍有柔毛或变无毛，有荚节 3—4，荚节近方形，具网脉；种子圆形，直径 2.3—2.7 毫米。花期 7—8 月，果期 10—11 月。

产广东西部、广西南部、云南西部和西南部。生于山坡灌丛中，海拔 1000 米以下。缅甸、泰国北部也有分布。

3. 排钱树 圆叶小槐花 (台湾植物志)，龙鳞草 (生草药性备要)，排钱草 (广东)，尖叶阿婆钱、午时合、笠碗子树 (海南)，亚婆钱 (江西寻鄜) 图版 2: 3

*Phyllodium pulchellum* (Linn.) Desv. in Journ. de Bot. ser. 2. 1: 124. t. 5. f. 24. 1815; et in Mem. Soc. Linn. Paris 4: 324. 1825; Benth. in Miq. Pl. Jungh. 217. 1852; Schindl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 20: 270. 1924; 广州植物志 333. 1956; Ohashi in Hara, Fl. E. Himal. 161. 1966, et in Ginkgoana 1: 276. 1973; 台湾植物志 3: 353. pl. 627. 1977. — *Hedysarum pulchellum* Linn. Sp. Pl. 747. 1753. — *Desmodium pulchellu* (Linn.) Benth. Fl. Hongk. 83. 1861; 中国主要植物图说·豆科 480. 图 467. 1955; 海南植物志 2: 272. 1965; 中国高等植物图鉴 2: 445. 图 2620. 1972.

灌木，高 0.5—2 米。小枝被白色或灰色短柔毛。托叶三角形，长约 5 毫米，基部宽 2 毫米；叶柄长 5—7 毫米，密被灰黄色柔毛；小叶革质，顶生小叶卵形，椭圆形或倒卵形，长 6—10 厘米，宽 2.5—4.5 厘米，侧生小叶约比顶生小叶小 1 倍，先端钝或急尖，基部圆或钝，侧生小叶基部偏斜，边缘稍呈浅波状，上面近无毛，下面疏被短柔毛，侧脉每边 6—10 条，在叶缘处相连接，下面网脉明显；小托叶钻形，长 1 毫米；小叶柄长 1 毫

米，密被黄色柔毛。伞形花序有花 5—6 朵，藏于叶状苞片内，叶状苞片排列成总状圆锥花序状，长 8—30 厘米或更长；叶状苞片圆形，直径 1—1.5 厘米，两面略被短柔毛及缘毛，具羽状脉；花梗长 2—3 毫米，被短柔毛；花萼长约 2 毫米，被短柔毛；花冠白色或淡黄色，旗瓣长 5—6 毫米，基部渐狭，具短宽的瓣柄，翼瓣长约 5 毫米，宽约 1 毫米，基部具耳，具瓣柄，龙骨瓣长约 6 毫米，宽约 2 毫米，基部无耳，但具瓣柄；雌蕊长 6—7 毫米，花柱长 4.5—5.5 毫米，近基部处有柔毛。荚果长 6 毫米，宽 2.5 毫米，腹、背两缝线均稍缢缩，通常有荚节 2，成熟时无毛或有疏短柔毛及缘毛；种子宽椭圆形或近圆形，长 2.2—2.8 毫米，宽 2 毫米。花期 7—9 月，果期 10—11 月。

产福建、江西南部、广东、海南、广西、云南南部及台湾。生于丘陵荒地、路旁或山坡疏林中，海拔 160—2000 米。印度、斯里兰卡、缅甸、泰国、越南、老挝、柬埔寨、马来西亚、澳大利亚北部也有分布。

根、叶供药用，有解表清热、活血散瘀之效。

4. 毛排钱树 鳞狸鳞 (中国主要植物图说·豆科)，毛排钱草、连里尾树 (海南) 图版 2: 4

*Phyllodium elegans* (Lour.) Desv. in Mem. Soc. Linn. Paris 4: 324. 1825; Schindl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 20: 270. 1924, incl. var. *typicum* Schindl. et var. *javanicum* Schindl.; 广州植物志 333. 1956; Ohashi in Ginkgoana 1: 269. 1973. — *Hedysarum elegans* Lour. Fl. Cochinch. 2: 450. 1790. — *Desmodium elegans* (Lour.) Benth. Fl. Hongk. 83. 1861, non DC. 1825. nec Schlecht. 1838; 中国主要植物图说·豆科 481. 图 469. 1955. — *D. blandum* van Meeuwen in Reinwardtia 6: 247. 1962; 海南植物志 2: 272. 1965.

灌木，高 0.5—1.5 米。茎、枝和叶柄均密被黄色绒毛。托叶宽三角形，长 3—5 毫米，基部宽 2—3 毫米，外面被绒毛；叶柄长约 5 毫米；小叶革质，顶生小叶卵形、椭圆形至倒卵形，长 7—10 厘米，宽 3—5 厘米，侧生小叶斜卵形，长比顶生小叶约短 1 倍，两端钝，两面均密被绒毛，下面尤密，侧脉每边 9—10 条，直达叶缘，边缘呈浅波状；小托叶针状，长约 2 毫米；小叶柄长 1—2 毫米，密被黄色绒毛。花通常 4—9 朵组成伞形花序生于叶状苞片内，叶状苞片排列成总状圆锥花序状，顶生或侧生，苞片与总轴均密被黄色绒毛；苞片宽椭圆形，长 14—35 毫米，宽 9—25 毫米，先端凹入，基部偏斜；花梗长 2—4 毫米，密被开展软毛；花萼钟状，长 3—4 毫米，被灰白色短柔毛，花冠白色或淡绿色，旗瓣长 6—7 毫米，宽 3—4 毫米，基部渐狭，具不明显的瓣柄，翼瓣长 5—6 毫米，宽约 1 毫米，基部具耳和瓣柄，龙骨瓣较翼瓣大，长 7—8 毫米，宽 2 毫米，基部多少有耳，瓣柄长约 2 毫米；雌蕊长 8—10 毫米，被毛，基部具小花盘，花柱纤细，弯曲，长 5—6 毫米，中部以下有毛。荚果通常长 1—1.2 厘米，宽 3—4 毫米，密被银灰色绒毛，腹缝线直或浅波状，背缝线波状，通常有荚节 3—4；种子椭圆形，长 2.5 毫米，宽 1.8—2 毫米。花期 7—8 月，果期 10—11 月。



图版 2 1. 长柱排钱树 *Phyllodium kurzianum* (Kuntze) Ohashi: 花枝。2. 长叶排钱树 *P. longipes* (Craib) Schindl.: 叶片。3. 排钱树 *P. pulchellum* (Linn.) Desv.: 叶片。4. 毛排钱树 *P. elegans* (Lour.) Desv.: 叶片。(许芝源绘)