

植物志 3: 261. 1977. — *Hedysarum heterocarpon* Linn. Sp. Pl. 747. 1753. — *Desmodium buergeri* Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. 3: 45. 1867. — *D. heterocarpon* (Linn.) DC. var. *buergeri* (Miq.) Hosokawa in Journ. Soc. Trop. Agr. 4: 201. 1932.

13a. 假地豆 (原变种) 图版 6: 1—2

var. *heterocarpon*

小灌木或亚灌木。茎直立或平卧，高 30—150 厘米，基部多分枝，多少被糙伏毛，后变无毛。叶为羽状三出复叶，小叶 3；托叶宿存，狭三角形，长 5—15 毫米，先端长尖，基部宽，叶柄长 1—2 厘米，略被柔毛；小叶纸质，顶生小叶椭圆形，长椭圆形或宽倒卵形，长 2.5—6 厘米，宽 1.3—3 厘米，侧生小叶通常较小，先端圆或钝，微凹，具短尖，基部钝，上面无毛，无光泽，下面被贴伏白色短柔毛，全缘，侧脉每边 5—10 条，不达叶缘；小托叶丝状，长约 5 毫米；小叶柄长 1—2 毫米，密被糙伏毛。总状花序顶生或腋生，长 2.5—7 厘米，总花梗密被淡黄色开展的钩状毛；花极密，每 2 朵生于花序的节上；苞片卵状披针形，被缘毛，在花未开放时呈覆瓦状排列；花梗长 3—4 毫米，近无毛或疏被毛；花萼长 1.5—2 毫米，钟形，4 裂，疏被柔毛，裂片三角开，较萼筒稍短，上部裂片先端微 2 裂；花冠紫红色，紫色或白色，长约 5 毫米，旗瓣倒卵状长圆形先端圆至微缺，基部具短瓣柄，翼瓣倒卵形，具耳和瓣柄，龙骨瓣极弯曲，先端钝；雄蕊二体，长约 5 毫米；雌蕊长约 6 毫米，子房无毛或被毛，花柱无毛。荚果密集，狭长圆形，长 12—20 毫米，宽 2.5—3 毫米，腹缝线浅波状，腹背两缝线被钩状毛，有荚节 4—7，荚节近方形。花期 7—10 月，果期 10—11 月。

产长江以南各省区，西至云南，东至台湾。生于山坡草地、水旁、灌丛或林中，海拔 350—1 800 米。印度、斯里兰卡、缅甸、泰国、越南、柬埔寨、老挝、马来西亚、日本、太平洋群岛及大洋洲亦有分布。

全株供药用，能清热，治跌打损伤。

13b. 糙毛假地豆 (变种) (海南植物志)

var. *strigosum* van Meeuwen in Reinwardtia 6: 95. 1961; 海南植物志 2: 275. 1965. — *Desmodium polycarpum* DC. Prodr. 2: 335. 1825. pro typ. et partim.

与原变种不同在于花序总梗密被贴伏的白色糙伏毛。

产广东、海南、广西、云南南部。常见于稀疏灌木丛中、山坡草地或溪边，海拔 450—900 米。印度、缅甸、泰国、越南、马来西亚、太平洋群岛、大洋洲至非洲亦有分布。

14. 显脉山绿豆 (海南植物志) 山地豆、假花生 (海南) 图版 6: 3

*Desmodium reticulatum* Champ. ex Benth. in Journ. Bot. Kew Misc 4: 46. 1852; Benth. Fl. Hongk. 84. 1861; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 2: 585. 1920; Schindl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 49: 295. 1928; Merr. et Chun in Sunyatsenia 2: 248. 1935; 海南植物志 2: 275. 1965. — *D. polycarpum* DC. var.