

长，宽1.8—2厘米，先端微凹，基部有2耳，翼瓣长5—5.7厘米，瓣柄长约7毫米，耳长2毫米，龙骨瓣长5—5.7厘米，瓣柄长约10毫米，耳长约1毫米；雄蕊管长4.5—5厘米；子房有毛，花柱无毛；胚珠3—4。果革质，卵形，长5—12厘米，宽3.5—6厘米，厚1.5—2厘米，被短毛和红褐色鳞毛，边缘有宽4—5毫米的翅，两面有10—20斜生、中部断裂的直立褶片；种子2—3颗，红褐色，具黑色条纹和斑点，肾形或近盘状，长约2.5厘米，厚约1.2厘米；种脐黑色，长稍超过种子周长的1/2。花期8月，果期10月。

产云南西部、西南部西双版纳等地。生长在海拔900—1100米的常绿阔叶林林缘处。泰国、柬埔寨、老挝、越南和马来西亚也有分布。

### 3. 兰屿血藤（台湾植物志）

*Mucuna membranacea* Hayata, Icon. Pl. Formos. 3: 73. 1913; Makino & Nemoto, Fl. Jap. 743. 1925; Tateishi & Ohashi in Bot. Mag. Tokyo 94: 97, f. 3. & 5b. 1981; Wilmot-Dear in Kew Bull. 39: 47. 1984. — *M. iriotensis* Ohwi in Act. Phytotax. Geobot. 5: 181. 1936. — *M. nigricans* (Lour.) auct. Jap. et Taiwan. non Steud.; Li, Woody Fl. Taiwan 355. 1963; 台湾植物志 3: 343. 1977.

攀援木质藤本。茎具细纵槽，老皮有皱纹；小枝无毛。羽状复叶具3小叶；托叶钻形，脱落；叶柄被毛，长3—10厘米；小叶膜质至纸质，顶生小叶菱状椭圆形或卵状菱形，长8—13厘米，宽6—8厘米，先端钝，渐狭成长1厘米尖头，并具细尖头，基部楔形至钝圆，侧生小叶偏斜，长达12厘米，两面被毛，上面稀疏，下面较密；侧脉4—6，在上面稍隆起，在下面明显凸起；小托叶线形，长2—3毫米；小叶柄长4—6毫米。花序长10—12厘米，下垂，通常每节有3花；花梗长6—10厘米，被毛；苞片广卵形，舟状，长12—14毫米，宽7—9毫米，开花前脱落，被灰白色伏贴短毛和褐色刺激性刚毛；花萼宽钟形，两面密被灰白色伏贴短毛，外面并被褐色刺激性刚毛；5裂但上部2裂片合生至近顶部，下面3裂片长10—12毫米；花冠暗紫色，旗瓣长3—3.5厘米，宽圆形，先端钝，凹缺，基部具耳，瓣柄长约3毫米，翼瓣长约5厘米，瓣柄长约7毫米，耳长约4毫米，龙骨瓣长约5厘米，瓣柄长约10毫米；雄蕊管长约4厘米，雄蕊二型；短花药长1.5毫米，着生在较粗的花丝上，长花药长3毫米，着生在较细的花丝上，子房长约1厘米，被毛，具2胚珠。果革质，不对称的椭圆状卵形至长圆形，长4—8厘米，宽4—5厘米，厚5—10毫米，背腹缝翅的边缘具啮蚀状齿，果的两面有偏斜的9—12翅状褶，且多在中部间断，有褐色开展的鳞毛；种子1—2颗，扁，带褐黑色，近圆形，直径约2厘米，种脐长为种子周长3/4。

产我国台湾兰屿和火烧岛。生于近海边常绿阔叶林中。日本琉球群岛、西表岛、石垣岛也有分布。

### 4. 大球油麻藤（云南种子植物名录）

*Mucuna macrobotrys* Hance in Walp. Ann. 2: 422. 1851; Benth. Fl. Hongk.