

裂片长椭圆形，微具纵脉，先端圆，宿存；花冠紫色至黄色，不伸出萼外。荚果斜圆形，与花萼等长或近等长，先端略弯，急尖，被短柔毛，熟时暗褐色；种子1颗；横椭圆形，长约3.5毫米，宽约3毫米，黑色，有肉质的种阜。花期10月，果期翌年2月。

产云南、广西。常生于河谷灌丛草坡上。印度、斯里兰卡，柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚亦有分布。

4. 鹿藿 (本草经) 老鼠眼, 痰切豆 图版 82: 2

Rhynchosia volubilis Lour. Fl. Cochinch. 460. 1790; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 6: 279. 1928; 海南植物志 2: 309; 中国高等植物图鉴 2: 507 图 2744. 1972; Thuàn in Aubrév. Fl. Camb. Laos Viêt. 17: 132. 1979.

缠绕草质藤本。全株各部多少被灰色至淡黄色柔毛；茎略具棱。叶为羽状或有时近指状3小叶；托叶小，披针形，长3—5毫米，被短柔毛；叶柄长2—5.5厘米；小叶纸质，顶生小叶菱形或倒卵状菱形，长3—8厘米，宽3—5.5厘米，先端钝，或为急尖，常有小凸尖，基部圆形或阔楔形，两面均被灰色或淡黄色柔毛，下面尤密，并被黄褐色腺点；基出脉3；小叶柄长2—4毫米，侧生小叶较小，常偏斜。总状花序长1.5—4厘米，1—3个腋生；花长约1厘米，排列稍密集；花梗长约2毫米；花萼钟状，长约5毫米，裂片披针形，外面被短柔毛及腺点；花冠黄色，旗瓣近圆形，有宽而内弯的耳，翼瓣倒卵状长圆形，基部一侧具长耳，龙骨瓣具喙；雄蕊二体；子房被毛及密集的小腺点，胚珠2颗。荚果长圆形，红紫色，长1—1.5厘米，宽约8毫米，极扁平，在种子间略收缩，稍被毛或近无毛，先端有小喙；种子通常2颗，椭圆形或近肾形，黑色，光亮。花期5—8月，果期9—12月。

产江南各省。常生于海拔200—1000米的山坡路旁草丛中。朝鲜、日本、越南亦有分布。模式标本采自广州。

根祛风和血、镇咳祛痰，治风湿骨痛、气管炎。叶外用治疮疥。

5. 渐尖叶鹿藿 图版 80: 3—4

Rhynchosia acuminatifolia Makino in Journ. Jap. Bot. 2: 4. 1920; 中国主要植物图说·豆科 696. 1955.

缠绕草本。茎纤细，微被短柔毛。叶具羽状3小叶；托叶小，膜质，卵形，早落；叶柄长2.5—7厘米，被短柔毛；小叶近膜质，顶生小叶卵形、宽椭圆形，长4—8厘米，宽2.5—5.5厘米，先端渐尖或长渐尖，基部圆形，叶两面均微被柔毛，下面具松脂状腺点；基出脉3，侧脉每边约3条，上面略被短柔毛，侧生小叶斜卵形，稍小；小托叶刚毛状；小叶柄短。总状花序腋生，纤细，通常与叶柄等长或近等长，被短柔毛；花较密，长约1厘米；花梗纤细，长约5—10毫米；花萼钟状，长约3—5毫米，裂片三角形，远短于萼管，下面一裂片稍长，微被短柔毛；花冠黄色，伸出萼外，各瓣近等长，均具瓣柄，旗瓣近圆形，基部两侧各具一内弯的耳，翼瓣狭椭圆形，一侧具明显下弯的耳，龙骨瓣先端具长喙；雄蕊二体；子房线形，胚珠2颗，花柱长而弯。荚果长圆形，扁平，长约1.5厘米。



图版 82 1. 鸡头薯 *Eriosema chinense* Vog.: 果枝。2. 鹿藿 *Rhynchosia volubilis* Lour.: 果枝。3. 中华鹿藿 *R. chinensis* H. T. Chang ex Y. T. Wei et S. Lee: 果枝。4. 淡红鹿藿 *R. rufescens* (Willd.) DC.: 果枝。
(黄门生绘)