

长约 3 毫米,无毛;花萼钟状,长 11—12 毫米,疏被褐色或混生白长柔毛,萼筒长 8—10 毫米,萼齿线状披针形,长 6—8 毫米,被黑色长毛;花冠粉红或紫白色,旗瓣宽倒卵形,长 22—27 毫米,瓣片长圆形,长 16—17 毫米,宽 11—12 毫米,先端微凹,下部突然渐狭,瓣柄长 7—9 毫米,翼瓣长 24—27 毫米,瓣片狭长圆形,长 15—17 毫米,宽 4—5 毫米,先端钝,瓣柄长 10—11 毫米,龙骨瓣长 20—22 毫米,瓣片弯月形,长 14—15 毫米,宽 6—7 毫米,瓣柄长 8—9 毫米,子房无毛,柄长 7—10 毫米,柱头被簇毛。荚果长圆形,长约 6 厘米,宽 1—1.2 厘米,先端喙状,基部狭入果颈,无毛,具网脉,近假 2 室,有 12—16 颗种子,果颈长达 2 厘米;种子褐色,近肾形,长约 3.5 毫米,横宽约 6 毫米,具凹窝。花期 5—6 月,果期 7—10 月。

产内蒙古西部(乌拉特,模式标本产地)、宁夏中部(贺兰山)、甘肃中部至西部(兰州、靖远、肃北)、青海东部(循化、同仁)。生于海拔 1 500—2 250 米的山谷、水旁、滩地或山坡。

本种可作黄耆药用,故 Franchet 用种加词为“*hoantchy*”(黄耆),但并非正品。《中药志》认为模式产蒙古库伦,称库伦耆。经查,蒙古并不产本种,显系鉴定错误。

2b. 边陲黄耆(亚种)(植物研究)

subsp. *dshimensis* (Gontsch.) K. T. Fu, grad. nov. — *A. dshimensis* Gontsch. in Not. Syst. Inst. Bot. Acad. Sci. USSR 10: 30. 1946 et in Kom. Fl. USSR 12: 23. 1946; K. T. Fu in Bull. Bot. Res. 2(1): 132. 1982.

本亚种与原亚种的区别在于:花黄色,长约 2 厘米;花萼除齿缘具疏长毛外无毛;荚果长不超过 6 厘米,宽不超过 1 厘米,近假 2 室;果梗有散生毛;种子褐色,近肾形,长约 2.5 毫米,宽约 4.5 毫米,平滑。

产新疆西部至北部(阿克苏、和硕、吐鲁番、哈密、乌鲁木齐、巴里坤、玛纳斯、富蕴)。生于低山,山地草原或砂砾质干山坡。中亚也有分布。

系 2 扁荚系——Ser. *Sesbanella*. — Sect. *Sesbanella* Bunge in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. VII. 11 (16): 4. 1868 et 15(1): 2. 1869, excl. sp. bicuspid. med. fix. vestit.

茎直立或外倾,纤细。托叶草质,较小叶大,离生或基部合生。花组成稀疏总状花序;苞片钻形,无小苞片;花冠长不超过 1.2 厘米。荚果长不超过 2 厘米。

我国有 3 种和 1 变种。

3. 侧扁黄耆(植物研究) 图版 21: 9—16

Astragalus falconeri Bunge in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. VII. 11 (16): 4. 1868 et 15(1): 2. 1869; Baker in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 120. 1876; Ali in Nasir et Ali, Fl. W. Pakist. 100: 130. 1977; K. T. Fu in Bull. Bot. Res. 2(1): 131. 1982, 西藏植物志 2: 812. 1985. — *A. falconeri* Bunge var. *paucistrigosus* K. T. Fu in Bull. Bot. Res. 2(1): 131. 1982.