

椭圆形,两头尖,1室,果颈与萼筒近等长。

产四川(木里)、云南(丽江)、西藏(波密)。生于海拔2700—4000米的山坡林下或灌丛中。模式标本采自四川木里。

“从原始记载看,本种似应隶属于假草木樨组 Sect. *Melilotopsis* Gontsch., 因编者未见到标本,暂仍置本组。又据《西藏植物志》2: 827. 1985 载: 产于西藏郎县的郎县黄耆 *A. langxianensis* P. C. Li et Ni “*langxianensis*” 接近于本种,亦因未见该种标本,本志未收载”。

50. 黑紫花黄耆(中国主要植物图说·豆科)

*Astragalus przewalskii* Bunge in Mém. Biol. 10: 52. 1877; id. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 24:32. 1877; Pet. -Stib. in Acta Hort. Gothob. 12:50. 1937—1938; 中国主要植物图说·豆科 412. 图 407. 1955; Y. C. Ho in Bull. Bot. Lab. N. -E. For. Inst. 8(8): 52. 1980.

多年生草本,地下具纺锤状块根。茎直立,高30—100厘米,通常中部以下无叶,仅有叶鞘,叶鞘膜质,卵形,抱茎,长约1厘米。羽状复叶有9—17片小叶,长5—12厘米;叶柄长约1厘米;托叶离生,披针形,长5—8毫米,无毛或下面疏被白色柔毛;小叶线状披针形,长1.5—3.5厘米,宽2—8毫米,先端渐尖,基部钝圆,上面绿色,无毛,下面灰绿色,疏被白色短柔毛。总状花序稍密集,有10余朵花;总花梗与叶近等长或稍长;苞片披针形,长3—5毫米,背面被白色或黑色柔毛;花梗长2—3毫米,连同花序轴均被白色或黑色柔毛;花萼钟状,长5—7毫米,外面被黑色柔毛,萼齿三角状披针形,长1.5—2毫米;花冠黑紫色,旗瓣倒卵形,长10—12毫米,先端微凹,基部渐狭成瓣柄,翼瓣较旗瓣稍短,瓣片长圆形,具短耳,瓣柄与瓣片近等长,龙骨瓣较翼瓣稍短,瓣柄与瓣片等长或稍长;子房明显具柄,被黑色短柔毛。荚果膜质,膨大,梭形或披针形,成熟时两侧压扁,长18—30毫米,宽8—9毫米,先端尖,果颈与萼筒近等长,被黑色短柔毛,网纹明显,1室;种子5—8颗,圆肾形,直径约2毫米,棕褐色。花期7—8月,果熟期8—9月。

产我国四川西北部及甘肃、青海。生于海拔2500—4100米的阴坡、沟旁湿处。模式标本采自甘肃。

51. 黄耆(本草经) 膜荚黄耆(中国主要植物图说·豆科) 图版 34: 1—8

*Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bunge in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. VII. 11 (16): 25. 1868 et 15 (1): 30. 1869; Kom. in Acta Hort. Petrop. 22:586. 1904; Pet. -Stib. in Acta Hort. Gothob. 12:47. 1937—1938; Kitagawa Lineam. Fl. Mansh. 281. 1939; Gontsch. in Kom. Fl. USSR 12:38. 1946; 中国主要植物图说·豆科 414. 图 410. 1955; 中国高等植物图鉴 2: 424. 图 2577. 1972; 东北草本植物志 5: 87. 图版 38(1—6). 1976. — *Phaca membranacea* Fisch. in DC. Prodr. 2:273. 1825. — *A. propinquus* B. Schischk. in Kreil. Fl. West. Sibir. 7:167. 1933. — *Astragalus*