

头有极短的柔毛。 花期 4 月。

产四川西部泸定(模式标本产地)。生于江边。

127. 巫山黄耆(中国主要植物图说·豆科)

*Astragalus wushanicus* Sims. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 8: 248. 1915; Pet.-Stib. in Acta Hort. Gothob. 12: 40. 1937—1938; 中国主要植物图说·豆科 378. 1955.

多年生草本。根直伸,绳索状。茎丛生,少分枝,长达 12 厘米,被开展的柔毛。奇数羽状复叶,具 11—17 片小叶,长达 14 厘米;叶柄长 1—4.5 厘米;托叶三角形,互相合生,边缘具白色缘毛;小叶宽卵形至长圆形,长达 10 毫米,宽达 8 毫米,先端微凹,基部圆形,上面无毛,下面散生白色柔毛,几无柄,顶生小叶的柄长 2—3 毫米。总状花序生少数花,疏松近伞形;总花梗腋生,较叶短;苞片线形,先端尖,长约 1.5 毫米;花梗长约 2.5 毫米,后期长达 4 毫米,密被白色柔毛;花萼短钟状,长约 3 毫米,萼齿钻形,不等长,长 0.5—1.5 毫米,连同萼筒均散生白色柔毛;花冠粉红色,旗瓣狭倒卵形,长约 11.5 毫米,宽约 5 毫米,先端微凹,基部渐狭,翼瓣长约 11 毫米,宽 1.5 毫米,瓣片先端尖,基部具 1 毫米长的耳,瓣柄长约 5.5 毫米;子房具短柄,被柔毛,有多数胚珠。荚果两端尖,被粗伏毛。

产四川巫山(模式标本产地)。生于崖壁石隙中。

128. 蜀西黄耆(中国主要植物图说·豆科) 图版 51: 1—8

*Astragalus souliei* Sims. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 8: 246. 1915; Pet.-Stib. in Acta. Hort. Gothob. 12: 41. 1937—1938; 中国主要植物图说·豆科 378. 1955.

多年生草本。根直伸,暗褐色。茎直立或上升,多分枝,高 10—25 厘米,带暗红色,被白色短柔毛。奇数羽状复叶,具 11—17 片小叶,长 5—7 厘米;叶柄长 1.5—2 厘米;托叶卵状披针形,长约 0.5 毫米,先端急尖,中部以下合生,下面散生白色柔毛;小叶椭圆形或近圆形,长 5—10 毫米,宽 3—6 毫米,先端钝或微凹,基部近圆形,两面被白色短伏贴柔毛,具短柄。总状花序生 4—7 花,稍疏松,近伞形;总花梗腋生,通常较叶短;苞片线状披针形,长约 3 毫米;花梗较苞片短,连同花序轴均密被白色短柔毛;花萼钟状,长 6—7 毫米,外面散生白色短柔毛,内面仅萼齿被毛,萼齿线形,下边 3 齿长约 3 毫米,上边 2 齿长约 2 毫米;花冠黄色,旗瓣狭倒卵形,长 13—15 毫米,先端微凹,基部渐狭成瓣柄,翼瓣长 11—13 毫米,瓣片狭长圆形,宽 1—1.5 毫米,基部具短耳,瓣柄与瓣片近等长,龙骨瓣较翼瓣短,瓣片半卵形,基部具短耳,瓣柄与瓣片近等长;子房线形,被白色短柔毛,具柄。荚果狭长圆形,带紫红色,长 2.5—3 厘米,宽约 4 毫米,果颈较宿萼稍短。种子 10—20 枚。花果期 6—7 月。

产四川西部(理县、宝兴、康定)、生于海拔 2 000—2 900 米间的山沟溪边及石隙中。模式标本采自康定。