

质,假2室。

组模式种: 香黄耆 *A. odoratus* Lam.

我国产2种,分布于青藏高原及东北。

186. 湿地黄耆(东北植物检索表)

*Astragalus uliginosus* Linn. Sp. Pl. 1: 757. 1753; Pall. Spec. Astrag. 31. t. 16. 1800; Bunge in Mém. Acad. Sci. St Pétersb. VII. 15(1): 168. 1869; Kitagawa, Lineam. Fl. Mansh. 282. 1939; Boriss. in Kom. Fl. USSR 12: 435. 1946; 东北草本植物志 5: 100. 图版 43(1—9). 1976; 内蒙古植物志 3: 209. 图版 95(8—14). 1977; S. B. Ho in Bull. Bot. Res. 3(1): 39. 1983.

多年生草本,高30—100厘米。茎单一或数个丛生,直立,被白色伏贴毛。羽状复叶有15—23片小叶,长10—18厘米,有短柄;托叶下部连合,茎上部的卵状披针形,下部的卵状三角形;小叶椭圆形至长圆形,长20—30毫米,宽5—15毫米,先端钝圆或稍尖,常具刺状小尖头,基部通常圆形,上面无毛,下面被白色伏贴毛。总状花序生多数、紧密排列、下垂的花;总花梗较叶稍短;苞片卵状披针形,较萼短或近等长,膜质,疏被黑色伏贴毛,稀混生少数白色毛;花萼管状,长7—11毫米,被较密黑色伏贴毛,有时混生少量白色毛,萼齿线状披针形,长约为萼筒的1/2;花冠苍白绿色或稍带黄色,旗瓣宽椭圆形,长13—15毫米,顶端微凹,基部渐狭成短瓣柄,翼瓣较旗瓣短,瓣片与瓣柄近等长,线状长圆形,龙骨瓣较翼瓣短,瓣柄较瓣片稍短;子房无毛。荚果长圆形,长9—13毫米,膨胀,斜立,背缝线凹入,表面无毛,具细横纹,革质,假2室。花期6—7月,果期8—9月。

产东北各省及内蒙古自治区。生于林下湿草地及沼泽地带。朝鲜、蒙古及西伯利亚都有分布。

187. 青藏黄耆(植物研究)

*Astragalus peduncularis* Koyle, Illustr. Bot. Himal. 199. 1839; Bunge in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. VII. 15(1): 168. 1869; Baker in Hook. f. Fl. Brit. Ind 2: 136. 1872; Boriss. in Kom. Fl. USSR 12: 438. t. 30 (2). 1946; Gamaiun. et Fisjun in Pavl. фл. Казахст. 5: 195. 1961; S. B. Ho in Bull. Bot. Res. 3(1): 40. 1983; 西藏植物志 2: 809. 1985.

多年生草本,高20—75厘米。茎具微凸起的条纹,直立,下部微倾斜,被伏贴短毛。羽状复叶有15—25片小叶,长5—10厘米;托叶长6—8毫米,下部合生,三角状披针形;小叶椭圆状长圆形,稀宽线形,长7—19毫米,先端钝圆,通常有小尖头,上面散生伏贴毛或近无毛,下面被伏贴毛。总状花序生多花,排列疏松;总花梗生于顶端叶腋,长10—18厘米;苞片披针形,长2—3毫米,较花梗长,白色,膜质,被稀疏黑色缘毛;花下垂;花萼管状钟形,长8—10毫米,被白色或黑色或黑白混生毛,萼齿三角状钻形,长1—1.5毫米;花冠黄白色,有时旗瓣边缘稍带紫色,旗瓣长15—16毫米,瓣片宽倒卵形,先端有时微凹,基部