

0.5—1.5 毫米,上面疏被白色毛,下面毛较密。总状花序的花序轴短,生 6—9 花;总花梗为叶长的 1—2 倍或与其等长,腋生,较细弱,被白色伏贴毛;苞片小,披针形,较花梗稍短,被黑、白混生毛;花萼管状,长 8—10 毫米,被黑、白混生伏贴毛,萼齿短,钻状,长约为筒部的 1/6;花冠灰绿色,干时变黄,旗瓣长 18—20 毫米,倒卵形,先端微凹,中部以下收狭为瓣柄,翼瓣长 14—18 毫米,瓣片狭长圆形,较瓣柄稍短,龙骨瓣较翼瓣稍短,瓣片钝圆,长为瓣柄的 2/3;子房线形,有短柄。荚果线状钻形,斜向上直立,长 2.5—3 厘米,宽 1—1.5 毫米,密被白色绒毛,成熟时常平展,稍呈弧形弯曲。花期 6—7 月,果期 7—8 月。

产新疆南部、西藏(阿里扎达)。生于海拔 3 400 米左右的山坡砾石地。原苏联、巴基斯坦、印度都有分布。

240. 托木尔黄耆(植物研究)

Astragalus dsharkenticus Popov in Not. Syst. Inst. Bot. Acad. Sci. USSR 10: 11. 1947; Gamaiun. et Fisjun in Pavl. Фл. Казахст. 5: 249. t. 33(1). 1961; S. B. Ho in Bull. Bot. Res. 3(1): 62. 1983.

240a. 托木尔黄耆(原变种) 图版 79: 1—8

var. *dsharkenticus*

多年生草本。根木质化,粗壮弯曲。根颈生多数蔓状的细茎,长 13—40 厘米,具伏贴的绒毛,淡绿色。羽状复叶有 7—11 片小叶,长 4—7 厘米;叶柄较叶轴短,淡绿色或灰白色;托叶基部合生,上部狭三角状钻形,长 1—2 毫米,具黑、白混生毛;小叶通常披针形,稀长圆形,长 10—20 毫米,宽 3—4 毫米,锐尖,两面被白色伏贴毛。总状花序生 4—10 花,排列紧密,近伞房状;花序轴和花梗被黑色毛;总花梗长 5—15 厘米,被白色伏贴毛,淡绿色;苞片披针形,长 1—2 毫米,近膜质,疏被黑、白混生毛;花萼管状,长 10—12 毫米,被黑色或白色半伏贴毛,萼齿丝状,长为筒部的 1/4 或 1/5;花冠淡黄色,旗瓣长 17—22 毫米,倒卵形,先端微凹,中部缢缩,下部收狭成瓣柄,翼瓣长 16—20 毫米,瓣片线状长圆形,先端偏斜,2 浅裂,较瓣柄稍长,龙骨瓣较翼瓣短,瓣片半长圆形,较瓣柄稍短;子房无柄。荚果长 20—30 毫米,宽 2—3 毫米,呈弧状,被黑色或黑白混生、半开展、有时旋卷的白色毛,有短尖头,腹缝线龙骨状凸起,背缝线微具沟槽,假 2 室,每室含种子多颗。花期 5—6 月,果熟期 6—7 月。

产新疆西部(阿克苏、昭苏)。生于海拔 1 800 米以上的山坡草地。中亚地区也有分布。为当地优良牧草。

240b. 巩留黄耆(植物研究) 图版 79: 9—14

var. *gongliuensis* S. B. Ho in Bull. Bot. Res. 3(1): 63. f. 16. 1983.

本变种与原变种不同之点在于:羽状复叶有 13—27 片小叶;小叶长圆形或狭椭圆形,先端钝圆或急尖,上面无毛或仅边缘被稀疏的毛,绿色。

产新疆(巩留、特克斯、昭苏)。生于海拔 1 000 米左右的沙荒地上。模式标本采自巩