

毛;花冠黄色,旗瓣长圆状倒卵形,长28—30毫米,宽约9毫米,上部稍狭,先端微凹,中部微缢缩,下部渐狭成瓣柄,翼瓣长25—26毫米,瓣片长圆形,先端微缺,瓣柄较瓣片长2—2.5倍;龙骨瓣长约20毫米,瓣片狭半圆形,长为瓣柄的一半;子房近无柄,被白色开展的毛。荚果未见。花期7—8月。

产宁夏(中宁)。生于海拔1300米的农田水渠边。模式标本采自中宁。

本变种与原变种不同之处在于:小叶较小,长不及8毫米(原变种长达18毫米);旗瓣卵状长圆形,中部以下渐狭成瓣柄,龙骨瓣及翼瓣的瓣片短,长仅为瓣片的1/2。

275. 华贵黄耆(新拟)

Astragalus nobilis Bunge ex B. Fedtsch. in Acta Hort. Petrop. 24: 236. 1905; Boriss. in Kom. Fl. USSR 12: 867. t. 50(1). 1946.

275a. 华贵黄耆(原变种)

var. *onbilis*

产中亚帕米尔阿赖山区。中国未见分布。模式标本产中亚帕米尔阿赖山区(乌腊久别)。

275b. 钝叶华贵黄耆(变种)(植物研究) 图版92: 14—23

var. ***obtusifoliolatus*** S. B. Ho in Bull. Bot. Res. 3(4): 58. f. 8. 1983.

多年生草本,高5—15厘米。茎极短缩,不明显,地下部分有短分枝,成疏丛状。羽状复叶有5—9片小叶,长3—7厘米;叶柄与叶轴近等长,密被白色伏贴毛;托叶下部与叶柄贴生,上部宽卵圆形,先端渐尖,膜质,密被白毛;小叶长圆状倒卵形或椭圆形,先端钝圆,长5—10毫米,两面密被白色伏贴毛,灰绿色。总状花序卵状球形,生10余朵花,花序轴长2—4厘米;总花梗被白色伏贴毛,紧接花序处混生黑色毛,连同花序轴为叶长的1.5—2倍;苞片卵圆形或长圆形,长4—6毫米,疏被白、黑色缘毛;花萼初期管状,后膨大成圆卵形,上部带红色,长10—12毫米,密被开展的白色毛和少量黑色伏贴毛,果期毛渐稀疏,萼齿钻状,长为萼筒的1/3—1/2,被较多的黑色毛;花冠紫红色(干后黄色),旗瓣长18—21毫米,狭椭圆形,先端微凹,中部缢缩,下部渐狭成瓣柄,翼瓣较旗瓣短,瓣片长圆形,先端具偏斜的微缺,较瓣柄稍短,龙骨瓣长14—18毫米,瓣片近半圆形,长为瓣柄的1/2。荚果包于膨大的宿萼内,卵圆形,长5—6毫米,被白色毛,两侧扁平,腹缝线微呈龙骨状凸起,背缝线有浅沟,近假2室,每室含种子1—2颗。花期5—6月,果期6—7月。

产新疆西部(温泉、乌恰)。生于海拔2800—3000米的草地及冲积地上。模式标本采自乌恰吉根西姆哈纳。

本变种与原变种不同处在于:小叶长圆状倒卵形或椭圆形,先端钝圆;总花梗与叶等长或稍长;花冠紫红色。

276. 温泉黄耆(植物研究) 图版92: 7—13

Astragalus wenquanensis S. B. Ho in Bull. Bot. Res. 3(4): 58. f. 7. 1983.