

系名模式：乌拉尔棘豆 *Oxytropis uralensis* (Linn.) DC.

中国有 6 种，分布于华北、西北和西南等地区。4 种延至中亚五国或西西伯利亚至蒙古西北部。

82. 长苞棘豆(新疆植物检索表)

Oxytropis longibracteata Kar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 14: 403. 1841; Bunge in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. sér. 7. 22(1): 81. 1874; id. Astrag. Turk. 194. 1880; I. Vass. et B. Fedtsch. in Kom. Fl. URSS 13: 76. 1948; Bajt. in Pavl. Фл. Казахст. 5: 360. 1961.

多年生草本，高 12—18 厘米。根粗壮。茎缩短，具分枝，绿色。羽状复叶长 10—15 厘米；托叶膜质，披针形，于 1/3 处与叶柄贴生，彼此合生很高，具纤毛，上部具 3 脉；叶柄与叶轴被开展长柔毛；小叶 29—39，卵形，下部小叶长 12—15 毫米，宽 5—6 毫米，向上逐渐变小，先端渐尖，两面被贴伏疏柔毛。多花组成长圆形总状花序，丛生状；总花梗与叶等长，或稍长，直立，被开展白色柔毛，上部混生黑色柔毛；苞片披针形，长 12—17 毫米，先端长渐尖，疏被长柔毛；花长 20 毫米；花萼筒状钟形，长 10—12 毫米，被黑色短柔毛和白色长柔毛，萼齿披针形，长为萼筒之半；花冠淡紫色，旗瓣长 17—20 毫米，瓣片卵形，先端微缺，翼瓣长 13—15 毫米，龙骨瓣短于翼瓣，喙长约 1 毫米。荚果长圆状卵形，长 20—25 毫米，宽 5—7 毫米，喙钩状，长 8—10 毫米，腹面具深沟，被贴伏黑色和白色柔毛，隔膜宽，不完全 2 室，无果梗。 花果期 6—7 月。

产新疆阿尔泰山。生于山地河谷中。模式标本采自东哈萨克斯坦。哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和俄罗斯西伯利亚也有分布。

83. 克特明棘豆(新拟) 图版 24: 9—12

Oxytropis ketmenica Saposhn. in Not. Syst. Herb. Hort. Bot. Pétróp. 4(17—18): 134. 1923; I. Vass. et B. Fedtsch. in Kom. Fl. URSS 13: 82. 1948; Bajt. in Pavl. Фл. Казахст. 5: 361. tab. 51. f. 3. 1961.

多年生草本，高 8—12 厘米。茎缩短，残存有枯萎叶轴和托叶。羽状复叶长 5—7 厘米；托叶草质，披针形，于 1/3 处与叶柄贴生，于基部彼此合生，分离部分披针形，被白色长柔毛；叶柄与叶轴疏被长柔毛；小叶 21—25，卵形、广椭圆状披针形，长 5—8 毫米，宽 2—4 毫米，先端尖，两面被贴伏白色长柔毛。4—8 花组成头形总状花序；总花梗与叶等长，或比叶长 1 倍，被开展长柔毛；苞片披针形，长约 3 毫米，被长柔毛；花长 15 毫米；花萼筒状钟形，长 9—10 毫米，被贴伏黑色和白色疏柔毛，萼齿披针形，长 2—3 毫米；花冠紫蓝色，旗瓣长约 15 毫米，瓣片宽圆形，先端凹，翼瓣长 14—15 毫米，龙骨瓣长 13 毫米，喙长 1.5 毫米。荚果长圆状卵形，长 15—16 毫米，宽 5—6 毫米，喙弯曲，被开展黑色和白色柔毛。 花果期 7—8 月。

产新疆昭苏和察布查尔等地。生于高山草甸和石质山坡。模式标本采自哈萨克斯坦克特明山区。哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦也有分布。