

质，下垂，有 5 棱，很少 6 或 3 棱，横切面呈星芒状，长 5—8 厘米，淡绿色或蜡黄色，有时带暗红色。种子黑褐色。花期 4—12 月，果期 7—12 月。

生于路旁、疏林或庭园中。

广东、广西、福建、台湾、云南有栽培。原产马来西亚、印度尼西亚。现广植于热带各地。

果生津止渴，亦入药。根、皮、叶、止痛止血。

2. 三敛 (岭南杂记)

Averrhoa bilimbi L. Sp. Pl. 428. 1753; DC. Prodr. 1: 689. 1824; Edgew. et Hook. f. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 439. 1874; R. Knuth in Engl. Pflanzenr. Heft 95. 4 (130): 418. 1930.

小乔木，高 5—6 米。叶聚生于枝顶，小叶 10—20 对；小叶片长圆形，长 3—5 厘米，宽约 2 厘米，先端渐尖，基部圆形，多少偏斜，两面多少被毛，边缘全缘；叶柄长 2—4 毫米，被柔毛。圆锥花序生于分枝或树干上；萼片 4 毫米长，卵状披针形，急尖，被柔毛，花瓣长圆状匙形，长于萼片 2 倍以上。果实长圆形，具钝棱。花期 4—12 月，果期 7—12 月。

广东、广西偶有栽培。台湾较多栽培。原产可能为亚洲热带的印度至马来西亚。

果实味酸，主要用作嫁接阳桃的砧木。

2. 酢浆草属 *Oxalis* L.

L. Sp. Pl. 433. 1753

一年生或多年生草本。根具肉质鳞茎状或块茎状地下根茎。茎匍匐或披散。叶互生或基生，指状复叶，通常有 3 小叶，小叶在闭光时闭合下垂；无托叶或托叶极小。花基生或为聚伞花序式，总花梗腋生或基生；花黄色、红色、淡紫色或白色；萼片 5，覆瓦状排列；花瓣 5，覆瓦状排列，有时基部微合生；雄蕊 10，长短互间，全部具花药，花丝基部合生或分离；子房 5 室，每室具 1 至多数胚珠，花柱 5，常 2 型或 3 型，分离。果为室背开裂的蒴果，果瓣宿存于中轴上。种子具 2 瓣状的假种皮，种皮光滑。有横或纵肋纹；胚乳肉质，胚直立。

本属模式种：白花酢浆草 *Oxalis acetosella* L.

约 800 种，全世界广布，但主要分布于南美和南非，特别是好望角。我国有 5 种，3 亚种，1 变种，其中 2 种为驯化的外来种。另外尚有多个外来种，均属庭园栽培。

花色多样，大花的种类常作庭园观赏植物。个别种的幼茎和嫩叶可作蔬食，但富含草酸，不利于健康，常作兔饲料。