

1b. 山酢浆草 (中国高等植物图鉴) 图版 3: 5—9

ssp. *griffithii* (Edgew. et Hook. f.) Hara in Journ. Jap. Bot. **30**: 22. 1955 et Fl. E. Himal. 168. 836. 661. 1966; 云南植物名录 **1**: 299. 1984; 横断山区维管植物 **1**: 1021. 1933; H. Koba, S. Akiyama, Y. Endo and H. Ohba, Name List Fl. Pl. Gymnosp. Nepal, 335. 1994. — *O. griffithii* Edgew. et Hook. f. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **1**: 436. 1874; Moore in Journ. Bot. **13**: 230. 1875; Borb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**: 99. 1886; Diels in Bot. Jahrb. **29**: 420. 1900, et in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **7**: 223. no. 4286. 1912; Hayata, Mat. Pl. Form. **1**: 114. 1911; R. Knuth in Engl. Pflanzenr. Haft 95. **4** (130): 234. 1930; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 617. 1933; 中国高等植物图鉴 **2**: 519. 图 2767. 1972; 湖北植物志 **2**: 312. 1979; 秦岭植物志 **1** (3): 117. 1981; 西藏植物志 **3**: 2. 1986; 云南植物志 **5**: 104. 1991. — *Acetosella griffithii* (Edgew. et Hook. f.) O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. **1**: 91. 1891. — *O. hupehensis* R. Knuth in Notzbl. Bot. Gard. Berlin **7**: 308. 1919, syn. nov. — *O. acetosella* L. ssp. *formosana* Terao in Acta Phytotax. Geobot. **30**: 61. 1977 et **32**: 74. 1981. — *O. japonica* auct. non Franch. et Sav.; Franch. Pl. David. **1**: 26. 1869. — *O. acetosella* L. ssp. *japonica* auct. non (Franch. et Sav.) Hara; Fl. Taiwan **3**: 427. 1977.

本亚种与原亚种的主要区别在于小叶倒三角形或宽倒三角形; 蒴果椭圆形或近球形。

分布于华东、华中、西南、陕西和甘肃。生于海拔 800—3 000 米的密林、灌丛和沟谷等阴湿处。尼泊尔、印度有分布。

全草入药, 能利尿解热。

1c. 三角酢浆草 (东北草本植物志) 大山酢浆草、截叶酢浆草 (拉汉种子植物名称) 图版 2: 1—2


ssp. *japonica* Hara in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo, **6**: 82. 1952. — *O. japonica* Franch. et Sav. Enum. Pl. Jap. **2**: 308. 1875. — *O. obtriangulata* Maxim. in Bull. Acad. Sci. Petersb. **12**: 62. 1867; Franch. et Sav. Enum. Pl. Jap. **2**: 308. 1879; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**: 99. 1886; Kom. Fl. Mansh. **2**: 653. 1903; R. Knuth in Engl. Pflanzenr. Heft 95, **4** (130): 234. 1930; 东北草本植物志 **6**: 4. 1977. — *Acetosella obtriangulata* (Maxim.) O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. **1**: 91. 1891.

本亚种与原亚种的主要区别在于小叶宽倒三角形; 蒴果长圆柱形。

分布于东北地区。生于山地阴湿林下、灌丛和溪流边。日本、朝鲜和俄罗斯远东地区有分布。

1d. 白鳞酢浆草 (云南植物志)

ssp. *leucolepis* (Diels) Huang et L. R. Xu, st. nov. — *O. leucolepis* Diels in Not.



图版 3 1—4. 酢浆草 *Oxalis corniculata* L. var. *corniculata*; 1. 植株; 2. 托叶; 3. 花;
4. 果实。5—9. 山酢浆草 *Oxalis acetosella* ssp. *griffithii* (Edgew. et Hook. f.) Hara;
5. 植株; 6. 雄蕊; 7. 除去花被的花; 8. 种子; 9. 根茎叶柄基。(李志民绘)