

Bot. Gard. Edinb. **5**: 223. 1912; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 617. 1933; 云南植物志 **5**: 106. 1991; ——— *O. acetosella* L. 横断山区维管植物 **1**: 1021. 1993, p. p.

本亚种与原亚种的主要区别在于植株细弱, 高 5—12 厘米; 小叶侧角宽圆形; 花小, 长 1—1.2 毫米。

分布于云南西北、四川西南和西藏东南部。生于海拔 2 600—3 800 米的阴湿林下、草地或灌丛。模式标本产云南大理。

2. **红花酢浆草** (广州植物志) 大酸味草 (广州)、铜锤草 (拉汉英种子植物名称)、南天七 (湖北植物志)、紫花酢浆草 (台湾植物志)、多花酢浆草 (西安)

Oxalis corymbosa DC. prodr. **1**: 696. 1824; 广州植物志 153. 1956; 海南植物志 **1**: 416. 图 225. 1964; Veldk. in Steenis, Fl. Mal. **7** (1): 159. 1971; 中国高等植物图鉴 **2**: 518. 图 2766. 1972; Huang in Fl. Taiwan **3**: 424. 1977; 湖北植物志 **2**: 312. 图 1192. 1979; 江苏植物志 **2**: 382. 图 1359. 1982; 福建植物志 **2**: 341. 图 261. 1985; ——— *Oxalis martiana* Zucc. in Denkschr. Akad. Wiss. Münch. **9**: 144. 1824; Benth. Fl. Hongk. 56. 1861; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**: 99. 1886; R. Knuth in Engl. Pflanzenr. Heft 95. **4** (130): 250. 1930.

多年生直立草本。无地上茎, 地下部分有球状鳞茎, 外层鳞片膜质, 褐色, 背具 3 条肋状纵脉, 被长缘毛, 内层鳞片呈三角形, 无毛。叶基生; 叶柄长 5—30 厘米或更长, 被毛; 小叶 3, 扁圆状倒心形, 长 1—4 厘米, 宽 1.5—6 厘米, 顶端凹入, 两侧角圆形, 基部宽楔形, 表面绿色, 被毛或近无毛; 背面浅绿色, 通常两面或有时仅边缘有干后呈棕黑色的小腺体, 背面尤甚并被疏毛; 托叶长圆形, 顶部狭尖, 与叶柄基部合生。总花梗基生, 二歧聚伞花序, 通常排列成伞形花序式, 总花梗长 10—40 厘米或更长, 被毛; 花梗、苞片、萼片均被毛; 花梗长 5—25 毫米, 每花梗有披针形干膜质苞片 2 枚; 萼片 5, 披针形, 长约 4—7 毫米, 先端有暗红色长圆形的小腺体 2 枚, 顶部腹面被疏柔毛; 花瓣 5, 倒心形, 长 1.5—2 厘米, 为萼长的 2—4 倍, 淡紫色至紫红色, 基部颜色较深; 雄蕊 10 枚, 长的 5 枚超出花柱, 另 5 枚长至子房中部, 花丝被长柔毛; 子房 5 室, 花柱 5, 被锈色长柔毛, 柱头浅 2 裂。花、果期 3—12 月。

分布于河北、陕西、华东、华中、华南、四川和云南等地。原产南美热带地区, 中国长江以北各地作为观赏植物引入, 南方各地已逸为野生, 日本亦然。生于低海拔的山地、路旁、荒地或水田中。因其鳞茎极易分离, 故繁殖迅速, 常为田间莠草。

全草入药, 治跌打损伤、赤白痢, 止血。

3. **大花酢浆草** (经济植物手册)

Oxalis bowiei Lindl. Bot. Reg. t. 1585; 新疆植物检索表 **3**: 209. 1983; 江苏维管植物检索表 365. 1986.

多年生草本, 高 10—15 厘米。根茎匍匐, 具肥厚的纺锤形根茎。茎短缩不明或无茎,

基部围以膜质鳞片。叶多数，基生；叶柄细弱，长 7—10 厘米，被柔毛，基部具关节；小叶 3，宽倒卵形或倒卵圆形，长 1.5—2 厘米，宽 2.5—3 厘米，先端钝圆形、微凹，基部宽楔形，表面无毛，背面被疏柔毛。伞形花序基生或近基生，明显长于叶，具花 4—10，总花梗被柔毛；苞片披针形，被柔毛；花梗不等长，长为苞片的 3—4 倍；萼披针形，长 10—12 毫米，宽 4—5 毫米，边缘具睫毛；花瓣紫红色，宽倒卵形，长为萼片的 2.5—3 倍，先端钝圆，基部具爪；雄 10，2 轮，内轮长为外轮的 2 倍，花丝基部合生；子房被柔毛。花期 5—8 月，果期 6—10 月。

北京、江苏、陕西、新疆等地有栽培。原产南非，我国引种作为观赏花卉。

4. 酢浆草（唐本草） 酸味草（广州）、鸠酸（唐本草）、酸醋酱（河南）

Oxalis corniculata L. Sp. Pl. 435. 1753; DC. Prodr. 1: 692. 1824; Benth. Fl. Hongk. 56. 1861; Edgew. et Hook. f. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 436. 1874; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 617. 1933; Gorschk. in Schischk. et Bobr. Fl. URSS 14: 77. 1949; 中国高等植物图鉴 2: 518. 图 2765. 1972; 东北草本植物志 6: 1. 1977; 福建植物志 2: 341. 1985; 西藏植物志 3: 1. 1986; 横断山区维管植物 1: 1020. 1993; H. Koba, S. Akiyama, Y. Endo and H. Ohba, Name List Fl. Pl. Gymnosp. Nepal, 395. 1994. — *O. repens* Thunb. Diss. Oxal. 16. n. 14. 1781; DC. Prodr. 1: 693. 1824. — *O. chinensis* Haw in Loud. Hort. Brit. Suppl. 1: 595. 1832, nomen. — *Acetosella chinensis* (Haw) O. Kuntze, Rev. Gén. Pl. 1: 92. 1891. — *O. fontana* Bunge in Men. Sav. Etr. Pétersb. 2: 87. 1835.

4a. 酢浆草 图版 3: 1—4

var. *corniculata*

草本，高 10—35 厘米，全株被柔毛。根茎稍肥厚。茎细弱，多分枝，直立或匍匐，匍匐茎节上生根。叶基生或茎上互生；托叶小，长圆形或卵形，边缘被密长柔毛，基部与叶柄合生，或同一植株下部托叶明显而上部托叶不明显；叶柄长 1—13 厘米，基部具关节；小叶 3，无柄，倒心形，长 4—16 毫米，宽 4—22 毫米，先端凹入，基部宽楔形，两面被柔毛或表面无毛，沿脉被毛较密，边缘具贴伏缘毛。花单生或数朵集为伞形花序状，腋生，总花梗淡红色，与叶近等长；花梗长 4—15 毫米，果后延伸；小苞片 2，披针形，长 2.5—4 毫米，膜质；萼片 5，披针形或长圆状披针形，长 3—5 毫米，背面和边缘被柔毛，宿存；花瓣 5，黄色，长圆状倒卵形，长 6—8 毫米，宽 4—5 毫米；雄蕊 10，花丝白色半透明，有时被疏短柔毛，基部合生，长、短互间，长者花药较大且早熟；子房长圆形，5 室，被短伏毛，花柱 5，柱头头状。蒴果长圆柱形，长 1—2.5 厘米，5 棱。种子长卵形，长 1—1.5 毫米，褐色或红棕色，具横向肋状网纹。花、果期 2—9 月。

全国广布。生于山坡草地、河谷沿岸、路边、田边、荒地或林下阴湿处等。亚洲温带和亚热带、欧洲、地中海和北美皆有分布。