

全草入药，能解热利尿，消肿散淤；茎叶含草酸，可用以磨镜或擦铜器，使其具光泽。牛羊食其过多可中毒致死。

4b. **直酢浆草** (东北植物检索表) 酸溜溜 (辽宁)

var. *stricta* (L.) Huang et L. R. Xu, st. nov. — *O. stricta* L. Sp. Pl. 433. 1753; DC. Prodr. 1: 692. 1824; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 99. 1886; Kom. Fl. Mansh. 2: 661. 1904; Kitag. Lineam. Fl. Mansh. 3: 298. 1939; Gorschk. in Schischk. et Bobr. Fl. URSS 14: 78. 1949; 东北草本植物志 6: 3. 1977.

与原种的主要区别在于茎直立，不分枝或少分枝；无托叶或托叶不明显。

分布于东北和华北。生于林下和沟谷潮湿处。东北亚、俄国、欧洲、地中海区和北美有分布。

5. **黄花酢浆草** (北京植物志)

*Oxalis pes-caprae* L. Sp. Pl. 434. 1753; 北京植物志 1: 489. 1993.

多年生草本，高 5—10 厘米。根茎匍匐，具块茎，地上茎短缩不明显或无地上茎，基部具褐色膜质鳞片。叶多数，基生；无托叶；叶柄长 3—6 厘米，基部具关节；小叶 3，倒心形，长约 2 厘米，宽 2—2.5 厘米，先端深凹陷，基部楔形，两面被柔毛，具紫斑。伞形花序基生，明显长于叶，总花梗被柔毛；苞片狭披针形，长 2.5—4 毫米，宽约 1 毫米，先端急尖；花梗与苞片近等长或稍长，被柔毛，下垂；萼片披针形，长 4.5—6 毫米，宽 1.5—2 毫米，先端急尖，边缘白色膜质，具缘毛；花瓣黄色，宽倒卵形，长为萼片的 4—5 倍，先端圆形、微凹，基部具爪；雄蕊 10，2 轮，内轮长为外轮的 2 倍，花丝基部合生；子房被柔毛。蒴果圆柱形，被柔毛。种子卵形。

北京、陕西、新疆等地有栽培。原产南非，我国作为观赏花卉引种。

### 3. 感应草属\* *Biophytum* DC.

DC. prodr. 1: 689. 1824; R. Knuth in Engl. Pflanzenr. Heft. 95.

4 (130): 391. 1930.

一年生或多年生草本。单茎或二歧分枝，基部通常木质化。叶聚生于茎顶或簇生于枝上，偶数羽状复叶；叶柄基部膨大；小叶对生，通常偏斜。花单生或数朵组成花序，腋生或顶生，有总花梗和花梗，前者或缺；花黄色，很少紫红色，萼片 5，披针形；花瓣 5；雄蕊 10，长短相间，花丝分离；子房近球形，5 室，花柱 5，柱头头状。蒴果卵状长圆形，室背开裂有时达基部，为 5 个广展的果瓣，果瓣与中轴分离，每果瓣有种子多粒，种皮常有小瘤状突起。

\* 《台湾植物志》取“羞礼花”为其正名。