

2. 粘木属* *Ixonanthes* Jack

Jack, Malay. Misc. 2, 7: 51. 1822.

乔木。叶互生，全缘或偶有钝锯齿；托叶细小或缺。花小，白色，二歧或三歧聚伞花序，腋生；萼片5，基部合生，宿存，木质化；花瓣5，旋转排列，宿存，环绕蒴果的基部；雄蕊10或20，着生于环状或杯状花盘的外缘；子房5室，与花盘分离，中轴胎座，每室有悬垂胚珠2颗；花柱单生，柱头头状或盘状。蒴果革质或木质，长圆形或圆锥形，室间开裂，有时每室被假隔膜分开；种子有翅或顶部冠以僧帽状的假种皮，胚乳肉质，胚侧生。

本属约10种，分布于热带亚洲。我国产2种。

分种检索表

1. 叶纸质，侧脉5—12对 1. 粘木 *I. chinensis* Champ.
 1. 叶革质，侧脉12—17对 2. 云南粘木 *I. cochinchinensis* Pierre
 1. 粘木 华粘木、山子绉（加积） 图版34

Ixonanthes chinensis Champ. in Proc. Linn. Soc. 2: 100. 1850; Hance in Journ. Bot. 20: 258. 1882; Dunn et Tutch. in Kew. Bull. Misc. Inf. Add. Ser. 10: 53. 1912; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 99. 1927; Hu in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. 1: 20. 1929; 海南植物志 2: 110. 图350. 1965; 中国高等植物图鉴 2: 534. 图2797. 1972; 福建植物志 2: 347. 图265. 1985.

灌木或乔木，高4—20米；树皮干后褐色，嫩枝顶端压扁状。单叶互生，纸质，无毛，椭圆形或长圆形，长4—16厘米，宽2—8厘米，表面亮绿色，背面绿色，干后茶褐色或黑褐色，有时有光泽，顶部急尖为镰刀状或圆而微凹，基部圆或楔尖，表面中脉凹陷，侧脉5—12对，通常侧脉有间脉。纤细，干后两面均凸起；叶柄长1至3厘米，有狭边。二歧或三歧聚伞花序，生于枝近顶部叶腋内，总花梗长于叶或与叶等长；花梗长5—7毫米；花白色；萼片5，基部合生，卵状长圆形或三角形，长2—3毫米，顶部钝，宿存；花瓣5，卵状椭圆形或阔圆形，比萼片长1—1.5倍；花盘杯状，有槽10；雄蕊10，花蕾期花丝内卷，包于花瓣内，花期伸出花冠外，长约2厘米；子房近球形；花柱稍长于雄蕊，柱头头状。蒴果卵状圆锥形或长圆形，长2—3.5厘米，宽1—1.7厘米，顶部

* 近代学者已将粘木属和 *Ochthocosmus* 属从古柯科分出来独立成粘木科 *Ixonanthaceae* Exell et Memdonca 1951, nom. conser. 本志是根据恩格勒系统，粘木属仍归古柯科中的一属。