

短锐尖，黑褐色，室间开裂为5果瓣，室背有较宽的纵纹凹陷。种子长圆形，长8—10毫米，一端有膜质种翅，种翅长10—15毫米。花期5—6月，果期6—10月。

分布于福建、广东、广西、湖南、云南和贵州，尤以海南中部最常见。生于海拔30—750米的路旁、山谷、山顶、溪旁、沙地、丘陵和疏密林中。越南有分布。模式标本产于香港。

为我国珍稀濒危植物。由于森林的砍伐，本种的生存正受到严重威胁。

2. 云南粘木（云南种子植物名录）

Ixonanthes cochinchinensis Pierre, Fl. For. Cochinch. 4. Pl.: 284A. 1892—1895; Guill in Lecomte, Fl. Gen. Indoch. 1: 584. 1911; 植物分类学报 6 (2): 245. 1957; 云南种子植物名录 1: 429. 1984.

乔木，高达30米；小枝灰褐色，光亮，无毛。叶互生，革质；叶片椭圆形或狭椭圆形，先端骤狭成偏于一侧的镰形、尾状或短尖头，基部楔形，两面无毛，侧脉12—17对，脉纹隆起；叶柄长1.5—2厘米，两侧具不明显的翅。二歧聚伞花序着生于小枝上部叶腋，与叶近等长；花梗长5—8毫米，每梗具长约1毫米的钻状苞片；萼片卵形，长3—4毫米，先端急尖，外被疏长柔毛；花瓣白色或淡绿色，阔卵形，长于萼片1—1.5倍，先端钝圆，基部宽楔形，雄蕊10，花丝长于花瓣2—2.5倍；子房近球形，花柱稍长于雄蕊，柱头头状。蒴果狭长圆形，褐棕色，长2.5—3厘米，宽1—1.2厘米，先端渐尖，基部圆楔形，室间开裂为5果瓣，花被宿存。种子长圆形，长约1厘米，一端具膜质种翅，翅长达1.5厘米。花期4—5月，果期6—9月。

分布于云南南部（近越南、老挝、缅甸等国地区）。生于海拔1000米以下的平原或低山常绿阔叶林中。