

瓣长 1.5—2 毫米，顶端的部分向内弯折；雌花有 4 枚具花药但无花粉的不育雄蕊，子房圆球形，花柱比子房长，柱头头状。分果瓣棕至茶褐色，薄壳质，长约 5 毫米，散生肉眼可见的半透明油点，每分果瓣有成熟种子 1 粒；种子卵形，背部浑圆，腹面略平坦，长约 4.5 毫米，厚约 3.5 毫米，褐黑色，种脐细小，约占腹面长度之 $1/3$ — $1/4$ 。花期 4—5 月及 9—10 月，果期 6 月及 11 月。

1a. 单叶吴萸 (原变种) 图版 12

var. *simplicifolia*

茎、叶均无毛。

产云南南部。见于海拔 650—1 300 米山地疏林中。越南、老挝、泰国、柬埔寨等也有。

1b. 毛单叶吴萸 (变种)

var. *pubescens* Huang in Acta Phytotax. Sin. 16: 83. 1978.

嫩枝、叶柄及叶背至少中脉上密被毛，油点大且较密，叶背中脉上的油点亦明显。

果期 8 月。

产云南南部：西双版纳 (模式标本产地)。见于海拔 500—700 米坡地疏林中。

2. 三桠苦 (增订岭南采药录) 三脚鳖 (台湾)，三支枪、白芸香 (广东)，石蛤骨 (广西)，三岔叶、消黄散 (云南)，郎晚 (云南傣族语)

Evodia lepta (Spreng.) Merr. in Trans. Amer. Philos. Soc. 23: 219. 1935; Huang in Acta Phytotax. Sin. 6: 91, Pl. 21, 1957; 中国高等植物图鉴 2: 547, 图 2823. 1972; 海南植物志 3: 34. 图 546. 1974; 台湾植物志 3: 514. 1977. — *Ilex lepta* Spreng. Syst. Veg. 1: 496. 1825. — *Lepta triphylla* Lour. Fl. Cochinch. 82. 1790. — *Zanthoxylum pteleae folium* Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. Bot. 3: 330. 1851, pro parte, quoad plantas Chinesenses — *E. pteleae folia* (Champ. ex Benth.) Merr. in Philip. Journ. Sci. 7: 377. 1912. — *E. lamarckiana* Benth. Fl. Hongk. 59. 1861, pro parte, exclud. syn. Lamk. et Chamisso — *E. roxbourghiana* Benth. Fl. Hongk. 59. 1861; Pierre, Fl. For. Cochinchin. 4, pl. 286A. 1893. — *E. chunii* Merr. in Journ. Arn. Arb. 6: 132. 1925. — *E. lepta* var. *chunii* Huang, l. c. 6: 92. 1957. — *E. triphylla* auct. non DC.: Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 104. 1886.

2a. 三桠苦 (原变种) 图版 13

var. *lepta*

乔木，树皮灰白或灰绿色，光滑，纵向浅裂，嫩枝的节部常呈压扁状，小枝的髓部大，枝叶无毛。3 小叶，有时偶有 2 小叶或单小叶同时存在，叶柄基部稍增粗，小叶长椭圆形，两端尖，有时倒卵状椭圆形，长 6—20 厘米，宽 2—8 厘米，全缘，油点多；小叶柄甚短。花序腋生，很少同时有顶生，长 4—12 厘米，花甚多；萼片及花瓣均 4 片；萼片细小，长约 0.5 毫米；花瓣淡黄或白色，长 1.5—2 毫米，常有透明油点，干后油点变暗褐至褐黑色；雄花的退化雌蕊细垫状凸起，密被白色短毛；雌花的不育雄蕊有花药而无花