

淡红或橙色，有1种子。花期4—5月，果期8—10月。

产云南南部（元江等地）。生于坡地林中。泰国东北部也有。

### 9b. 光叶山小橘(变种)

*var. glabra* (Craib) Tanaka in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, ser. 2, 2: 159. 1930 et in Journ. Bot. 68: 226. 1930; Merr. in Lingn. Sci. Journ. 14: 16. 1935; Huang in Guihaia 7: 122. 1987. — *Glycosmis singuliflora* var. *glabra* Craib, Fl. Siam. Enum. 1: 226. 1926.

小乔木，高达5米。嫩枝淡绿色，干后灰黄色。叶有小叶3—5片，有时2片，很少兼有单小叶；小叶柄长2—6毫米，稀较长；小叶硬纸质，长椭圆形、披针形或卵形，小的长5—10厘米，宽2—3厘米，大的长达17厘米，宽7厘米，顶部渐尖或短尖，基部渐狭尖或阔楔尖，全缘，干后叶背淡灰黄色，略有光泽，叶缘浅波浪状起伏，叶面中脉下半段凹陷呈沟状，叶背沿中脉及其两侧散生甚疏少而早脱落的褐锈色粉末状微柔毛，侧脉每边6—9条，甚纤细。花序很少达4厘米，腋生兼顶生；花梗甚短，与花萼裂片同被早落的褐锈色微柔毛或几无毛；花萼裂片卵形，长不及1毫米；花瓣甚早脱落，长约3毫米；雄蕊10枚，近于等长，花丝自上而下逐渐增宽，或同时兼有上宽下窄的，药隔背面及顶端各有1油点；子房在花蕾时为圆柱状或狭卵形，花开放后迅速膨大为阔卵形，或早期即为圆球形，散生干后微凸起或不凸起的油点，花柱短或几无，柱头略粗。果未成熟时椭圆形或橄榄形，或圆球形，成熟时近圆球形或倒卵形，径10—14毫米，橙红色，有种子1—2粒。花果期几乎全年。

产海南。生于海拔300—500米丘陵坡地灌木或杂木林中。泰国北部也有。

分布于海南内陆（五指山、吊罗山）的本种其小叶一般较小，其中，尚有个别植株的花，其子房为圆球形，果自幼期至成熟均为圆球形。但大多数的子房为阔卵形，极少数为圆柱状，它们的未成熟果为纺锤形，及至成熟时变为倒卵形或近圆球形。

### 10. 小花山小橘 山小橘、山橘仔（广州） 图版29: 1

*Glycosmis parviflora* (Sims) Kurz in Journ. Bot. n. s. 5: 40. 1876, pro syn. sub *G. citrifolia* Lindl.; Little in Phytologia 2: 463. 1948 et in U. S. Forest. Serv. Agr. Handb. 41: 472. 1953; Brizicky in Journ. Arn. Arb. 43: 89. 1962; Huang in Guihaia 7: 121. 1987. — *Limonia parviflora* Sims in Bot. Mag. t. 2416. 1823. — *L. citrifolia* auct. non Salisb.: Willd. Enum. Pl. Hort. Berol. 448. 1809. — *G. citrifolia* (Willd.) Lindl. in Trans. Hort. Soc. Lond. 6: 72. 1826; Huang in Acta Phytotax. Sin. 8: 77. 1959; 台湾植物志 3: 517. 图709. 1977, et auctt. — *G. erythrocarpa* (Hayata) Hayata, Icon. Pl. Form. 8: 14. 1919; Huang, l. c. 8: 77. 1959. — *Citrus erythrocarpa* Hayata, Icon. Pl. Form. 6: 13. 1916. — *Fortunella erythrocarpa* Hayata, l. c. in syn., nom. nud. — *G. cochinchinensis* auct. non (Lour.) Pierre ex Engl.: Li, Woody Fl. Taiwan 375, f. 135. 1963.

灌木或小乔木，高1—3米。叶有小叶2—4片，稀5片或兼有单小叶，小叶柄长1—5毫米；小叶片椭圆形，长圆形或披针形，有时倒卵状椭圆形，长5—19厘米，宽2.5—8