

(2) 茶枝柑 大红柑, 新会柑

cv. *Chachiensis* *C. chachiensis* Tanaka, *Sinocitrus chachiensis* Tseng.

果扁圆形, 果顶略凹, 柱痕明显, 有时有小脐, 蒂部四周有时有放射沟, 纵横径 4.6—5.9 厘米 × 6.3—7.1 厘米, 重 100—138 克, 深橙黄色, 皮厚 2.7—3.3 毫米, 瓢囊 10—12 瓣, 果肉汁多, 甜酸适度; 种子 15—25 粒, 端尖或钝, 多胚。果期 11—12 月。

主产广东 (新会、四会)。

茶枝柑与年橘各部形态都相似, 但茶枝柑的叶无内卷性 (两侧叶缘不向腹面卷起), 果较大, 果皮较厚且较粗糙, 花器也较大。较明显不同的是茶枝柑的花柱粗而短, 柱头比子房大, 果皮脆而易折断, 油胞显著, 年橘的花柱纤细而长, 柱头比子房小或等大, 果皮薄而韧, 油胞甚小, 曾勉教授将茶枝柑划入橘类《中国果树》2: 36. 1960), 本志从之。

茶枝柑的果皮制干即为中药陈皮, 是陈皮正品。王好古《汤液本草》(公元 1248 年) 载: “或云与陈皮一种, ……日久者佳, 故称陈皮”。历来所称陈皮, 原出广州, 故又称广陈皮, 就是茶枝柑的果皮。现药材商品已将行柑的果皮也列入陈皮之列。至于杂果皮则因产地不同而有异, 即包括各类柑皮和橘皮, 也还有用橙皮代替的。杂果皮的质量较差, 或在药效上各有所宜。但医家以陈皮贮藏日久者为优。

(3) 行柑 四会柑

cv. *Hangan* *C. suhoiensis* Tanaka, *C. suhuiensis* Tanaka, *C. reticulata* var. *szehuikan*, *suhuikan*. *Sinocitrus suhuiensis* (Tanaka) Tseng.

通常称四会柑是包括行柑、甜柑和贡柑三个品种的共称。行柑是从甜柑选育出来, 贡柑则似是柑与甜橙的杂交后代, 贡柑的果皮通常不作陈皮代品。甜柑又分细叶和大叶两系。它们的果通常较扁, 果顶微凹或圆, 蒂部圆, 有多条不明显的放射沟, 果皮较薄, 平滑而光亮, 果皮及瓢囊壁均较韧, 种子阔卵形或近圆形, 顶端钝或极少短尖, 果肉味甜, 风味好。

主产广东 (四会)。

(4) 柑* 有柑, 芦柑**, 汕头蜜柑, 广东蜜柑, 凸柑, 蜜糖柑。

cv. *Ponkan**** *C. poonensis* Tanaka, *Sinocitrus poonensis* (Tanaka) Tseng, *Swatow orange*, *Lou Kan*, *Mi Tan Kan*, *Wonurco*, *Chinese Honey*.

果扁圆形, 或蒂部隆起呈短颈状的阔圆锥形, 顶部平而宽, 中央凹, 有浅放射沟, 纵横径 5.1—6.1 厘米 × 6.1—7.8 厘米, 重 136—187 克, 也有较小或更大的, 橙黄至橙红色, 油胞大, 油量多, 皮粗糙, 松脆, 厚 2.7—3.5 毫米, 甚易剥离, 瓢囊 10—12 瓣, 果

* 柑, 读如 Peng, 广东东部、福建南部的地方方言, 或读如 Pang, 为松皮或空心之意。原字写成有, 其意为无。无与有, 实为谐音, 现已写成柑。

** 芦, 原为福建南部与广东东部的地方方言, 意指软绵绵的, 即成熟的果因果皮离开果肉手压之有软绵绵之感, 故芦为表意之词。但清代吴应逵《岭南荔枝谱》称“果非核种者”称为芦。

*** 旧译 Ponkan, 早已为国际园艺学者采用, 亦为商品名, 本志沿用之。