

或4，有短细毛；花瓣白色，5或4片，略呈肉质，有透明油点，长约1厘米，雄蕊多达50枚，通常不同程度地合生成多束，花丝甚短，花药线状而长。果梗长4—6厘米，与其着生的枝条约等粗，果纵径10—12厘米，横径6—8厘米。果皮淡绿黄色，平滑，干后硬木质，厚3—4毫米，10—15室，种子甚多，扁卵形，端尖，并有透明的粘胶质液，种皮有棉质毛，子叶大。果期10月。

产云南西双版纳。生于海拔600—1000米略干燥的坡地林中，有栽种。印度、缅甸、老挝、越南、柬埔寨、泰国、马来西亚、印度尼西亚也有。

根、树皮、叶、花均可用作清热剂。果肉有香气，用作清肠胃药，作缓泻剂用。在缅甸用嫩叶捣烂治创伤，疮疥及肿痛，脚及口腔疾病，叶捣烂后留汁液治疗眼病，食嫩叶可避孕或引致流产。

本种虽属热带植物，但冬季落叶。据报道，它可耐—8℃低温。在国外曾用以作嫁接柑橘属植物的砧木，生长迅速。

28. 象橘属* *Feronia* Correa

Correa in Trans. Linn. Soc. London 5: 224. 1800.

乔木。刺腋生，嫩枝叶均被柔毛。奇数羽状复叶，小叶对生，有透明油点，叶轴有或无翼叶。花两性或有时杂性，圆锥花序；花萼5浅裂；花瓣5片，很少4或6片，覆瓦状排列；雄蕊10—12枚，花丝扁，基部密被绵毛，花药线状长圆形，花盘短小；子房不完全的4—6室，果熟时几愈合成1室，柱头长圆状纺锤形，胚珠多。果圆球形，果皮硬壳质；种子甚多，藏于具粘胶汁的肉瓢中，有棉质毛，种皮薄膜质，子叶厚，肉质。

单种属。原产亚洲东南部热带地区。

染色体数 $X=9$, $2n=18$ 。

1. 象橘

Feronia limonia (L.) Swingle in Journ. Wash. Acad. Sci. 4: 328. 1914 et in Webb. et Batc. Citrus Indust. 1: 466. f. 73. 1943; Huang in Acta Phytotax. Sin. 8: 124. 1959; Swingle et Reece in Reuth. et al. Citrus Indust. 1: 416. f. 3—5. 1967. — *Schinus limonia* L. Sp. Pl. 389. 1753. — *Feronia elephantum* Correa in Trans. Linn. Soc. London. 5: 224. 1800.

冬季落叶小乔木。树皮灰白色，不裂，刺劲直，斜向上生。叶有小叶5—7片，小叶无柄，倒卵形或卵形，长2.5—4厘米，宽1—2.5厘米，顶端圆，常凹头，基部楔尖，全缘，成长叶无毛；叶轴通常有略明显的翼叶。花甚多，细小；花梗短而纤细，被短柔毛；花萼在花后常脱落；花瓣卵形，扩展；雄蕊7—12枚，花药甚大，花盘被毛，花柱甚短。果径5—6厘米，果皮木质，粗糙，果肉味酸甜；种子长圆形而略扁，有棉质毛。花期

* 曾称为“木苹果属”（胡先骕：经济植物手册 下册第一分册）