

常绿大乔木，高达 25 米以上，径可达 4 米，基部扩大成板根；树皮淡红色，鳞片状；枝条广展，平滑，灰色。叶长 35 厘米，有小叶 4—6 对，叶柄细长，基部略膨大，无毛；小叶片革质，斜披针形至斜卵状披针形，长 10—16 厘米，宽 4—6 厘米，先端长渐尖，基部明显偏斜，一侧楔形，另一侧近圆形，全缘或有时具 1—2 个浅波状钝齿，无毛而光亮，叶面深绿色，背面淡绿色，侧脉每边约 10 条，稍广展。圆锥花序腋生，长 6—15 厘米，无毛，具柄，有疏离而短的分枝；花具短柄，长约 3 毫米；萼浅杯状，5 裂，裂片短，圆形；花瓣白色，无毛，长 3—4 毫米，广展；雄蕊管无毛，裂齿短尖；子房圆锥状卵形，比花盘长，每室有胚珠 12 颗，花柱无毛，较子房为长，柱头盘状，5 出，放射状。蒴果大，卵状，木质，直径约 8 厘米，熟时 5 瓣裂；种子多数，长 18 毫米，连翅长 7 厘米。

花期 5—6 月，果期 10—11 月。

栽培于福建（厦门）、台湾、广东、广西（南宁）、海南（尖峰岭）及云南等省区。原产南美洲，现各热带地区均有栽培。

本种为世界上著名木料之一，色泽美丽，硬度适宜，易于打磨，且皱缩量少，能抗虫蚀，宜作装饰、家具、舟车等用。

陈锡沐等在《武汉植物学研究》4: 190. 1986 提及的大叶桃花心木 (*S. macrophylla* King)，其叶长为 3—8 厘米，果长 7.5—10 厘米，但我们未见到此种植物的花果标本，故本志暂不收入。

4. 非洲楝属 *Khaya* A. Juss.

A. Juss. in Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 19: 249. 1830.

乔木。叶为偶数羽状复叶；小叶全缘，无毛。圆锥花序腋上生或近顶生；花两性，4—5 基数；花萼 4—5 裂，裂片几达基部，覆瓦状排列，花瓣 4 或 5，分离，芽时远较萼片为长；雄蕊管坛状或杯状；花药 8—10，着生于雄蕊管内面近顶端；花盘杯状；子房 4—5 室，每室有胚珠 12—16 颗，少有 18 颗；柱头圆盘状，上面具 4 槽。果为蒴果，球形或近球形，木质，成熟时顶端 4—5 瓣裂，果壳厚，囊轴不达蒴果顶端，具 4—5 个锐利的脊，每室有种子 8—18 颗；种子宽，横生，椭圆形至近圆形，边缘有圆形膜质的翅；胚乳残存，子叶扁平，并生，胚根侧生。

8 种，分布于非洲热带地区和马达加斯加；我国广东引种栽培 1 种。

属模式种：非洲楝 *K. senegalensis* (Desr.) A. Juss.

1. 非洲楝（中国种子植物科属词典） 仙加树（华南植物园植物名录） 图版 10: 8

Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss. in Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 19: 249. 1830; Harms in Engl. u Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (4): 272, fig. 152; A—J. 1897, et ed. 2, 19b (1): 53, fig. 5. 1940; 广东植物志 2: 296, 图 190. 1991. ——*Swietenia*