

ed. 2. 19b (1); 77. 1940.

矮小亚灌木、灌木或乔木。叶通常互生，极少对生，单小叶、三小叶或多数小叶组成羽状复叶。雄蕊花丝全部连合成管状或中部以下连合成管状或分离；子房多为3—5室，有时1—2室；每室子房通常有胚珠1—2颗，有时达4—8颗。果为核果、浆果或蒴果，但种子无翅。

全世界产5族，38属；我国产4族，13属。

## 族 1. 杜楝族 Trib. 1. TURRAEAE Harms

Harms in Engl. u Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (4): 267. 1896, et

ed. 2. 19b (1): 85. 1940.

矮小亚灌木或灌木。叶互生，单叶、三小叶或奇数羽状复叶。雄蕊花丝全部合生成管或仅基部或下端合生，花药10；子房通常5室，每室有胚珠2颗。果为蒴果或核果。

全世界产7属；我国产3属。

## 6. 杜楝属 *Turraea* Linn.

Linn. Mant. 2: 150. 1771.

乔木或灌木。叶为单叶，互生，全缘或有时有钝锯齿，具柄；无托叶。花两性，细长，腋生，单生或组成短的总状花序或有时呈伞房花序状；花萼短，杯状或钟状，4—5齿裂；花瓣4—5，离生，线状匙形，远较花萼为长，芽时覆瓦状排列；雄蕊管狭长，圆柱形，顶端膨大且有裂齿；花药8—10，着生于雄蕊管口部之内，且与裂齿互生，内藏或略突出；花盘环状或无；子房小，近球形至椭圆形，无毛，4至多室，每室有倒生胚珠2颗，花柱丝状，伸出雄蕊管外，柱头盘状、头状或瓶状。果为蒴果，4至多室，室背开裂，果片革质或木质，由具翅的中轴上分离，每室有种子1—2颗；种子长椭圆形，多少弯曲，平滑，有1阔而复生的种脐，胚乳肉质，子叶叶状，胚根圆柱形。

90种，产亚洲热带地区、大洋洲和非洲南部。我国产1种。

属模式中：绿杜楝 *Turraea virens* Linn.

1. 杜楝 (植物分类学报) 图版 12: 1—3

*Turraea pubescens* Hellen in Vet. Acad. Nya Handl. 4: 308. 1788; DC. Prodr. 1: 620. 1824; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 113. 1886; C. DC. Monogr. Phan. 1: 446. 1878; Pellgr. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 1: 735. 1911; Merr. in Lingn. Sci. Journ. 5: 103. 1927; 侯宽昭、陈德昭, 植物分类学报 4: 4. 1955; Backer et Bakh. Fl. Java 2: 119. 1965; 海南植物志 3: 60, 图 564. 1974; 广东植物