

本变种与鹧鸪花（原变种）的主要区别在于小叶片长7—9厘米，宽3—4厘米，侧脉7—9对；蒴果较小，长1.5厘米，宽1—1.2厘米。

产广东、海南、广西、四川、贵州和云南等省区；生于中海拔以下山地密林或疏林中。分布于越南。

2. 茸果鹧鸪花（中国高等植物图鉴） 图版 16: 9—10

Trichilia sinensis Benth. in Acta Bot. Neerl. 11: 17. 1962. — *Heynea velutina* How et T. Chen in Acta Phytotax. Sin. 4: 37, fig. 4. 1955; 中国高等植物图鉴 2: 573, 图 2875. 1972; 海南植物志 3: 73. 1974; 广东植物志 2: 300, 图 195, 1991.

灌木，高1—3米；幼枝被黄色柔毛，后变无毛。叶为奇数羽状复叶，长13—30厘米，叶柄长5—7厘米，与叶轴均被开展的黄色柔毛；小叶7—9片，膜质，披针形或长椭圆形，长7—15厘米，宽2—5厘米，先端长渐尖，基部楔形，稍偏斜，叶面无毛或仅沿中脉被微柔毛，背面被黄色长柔毛，脉上尤密，侧脉每边8—9条，纤细，疏散，弯拱而连结；小叶柄长3—5毫米，顶端一枚更长，可达3厘米，密被黄色长柔毛。圆锥花序腋生，较叶略短，有细长的总花梗，被黄色柔毛，总花梗和分枝稍压扁，分枝由少花的小聚伞花序组成；花长4—5毫米；花梗长2—4毫米，中部以下具节，和花萼同被黄色柔毛；花萼杯状，长1—1.5毫米，5齿裂，裂齿卵状三角形，顶端钝；花瓣5，白色，长圆形，长3.5—4毫米，略尖，两面均无毛或仅于外面被疏柔毛；雄蕊管略短于花瓣，10深裂，裂片复2裂，管侧面无毛，内面近口部有髯毛；子房被柔毛，花柱向上略增大，柱头圆锥形，2裂。蒴果近球形，直径8—12毫米，被黄色柔毛和有极密的横线条；种子通常1，有时2，近球形，黑紫色或黑色，有光泽。 花期4—9月，果期8—12月。


产广东、广西等省区；生于低海拔山坡的疏林或灌木林中。越南也有。模式标本采自海南万宁。

亚族 2. 米仔兰亚族 Subtrib. 2. GUAREINAE Harms

Harms in Engl. u Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2. 19b (1): 39.
1940.

乔木或灌木。叶互生，奇数羽状复叶。雄蕊花丝全部连合成管状，雄蕊管球形，钟形、壶形或陀螺形，花药3—10；花盘不明显或退化；子房1—5室，每室有胚珠1—2颗。果为浆果或蒴果；种子有假种皮。

全世界产11属，我国产4属。



图版 16 1—7. 鹧鸪花 *Trichilia connaroides* (Wight et Arn.) Benth. var. *connaroides*: 1. 花枝, 2. 花, 3. 花瓣外面观, 4. 雄蕊管展开, 5. 雄蕊上部分离之花丝与花药, 6. 雌蕊, 7. 果序一部分。8. 小果鹧鸪花 *T. connaroides* (Wight et Arn.) Benth. var. *microcarpa* (Pierre) Benth.: 8. 果序一部分。9—10. 荳果鹧鸪花 *T. sinensis* Brntv.: 9. 叶之一部分, 示叶轴及小叶背面, 10. 果序之一部分。(余汉平绘)