

var. **macrophylla** (H. L. Li) C. Y. Wu, Fl. Yunnan. 1: 235. 1977; 云南种子植物名录, 上册 828. 1984. — *Aglaria wangii* H. L. Li var. *macrophylla* H. L. Li in Journ. Arn. Abr. 25: 304. 1944; 侯宽昭、陈德昭, 植物分类学报 4: 26. 1955.

本变种与四瓣崖摩(原变种)之主要区别在于小叶长达 30 厘米, 宽 11.5 厘米。

产云南南部(勐海); 生于海拔 1 400 米左右的森林中。模式标本采自云南勐海。

亚族 3. 桤木亚族 Subtrib. 3. DYSOXYLINAE Harms

Harms in Engl. u Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2. 19b (1): 40. 1940.

乔木或小乔木, 有时灌木。叶互生, 奇数羽状复叶。雄蕊花丝连合成管, 雄蕊管圆筒形, 花药 8—10; 花盘管状, 与子房等长或更长。子房 4—5 室, 每室有胚珠 1—2 颗。果为蒴果; 种子有假种皮。

全世界产 6 属; 我国产 1 属。

15. 桤木属 *Dysoxylum* Bl.

Bl. Bijdr. 172. 1825.

乔木或小乔木, 有时灌木。叶互生或很少对生, 羽状复叶; 小叶通常全缘, 有时有细齿或缺刻, 具柄, 基部常偏斜。花两性, 4 或 5 基数, 组成腋生的圆锥花序; 萼杯状, 4—5 齿裂或分裂为 4—5 萼片; 花瓣 4—5, 长圆形, 芽时镊合状排列或顶部稍呈覆瓦状排列, 分离或有时下部与雄蕊管合生; 雄蕊管圆筒形, 略较花瓣为短, 顶端通常具条裂或钝齿, 花药 8—10, 内藏于雄蕊管顶部; 花盘管状, 与子房等长或更长, 全缘或具钝齿; 子房 4—5 室, 很少 3 室, 每室有胚珠 1—2 颗; 花柱约与雄蕊管等长, 柱头盘状。果为蒴果, 球形或梨形, 5—4 (3) 瓣裂, 每室有种子 1—2 颗; 种子具假种皮或无, 种脐宽, 腹生, 子叶大。

约 75 种, 分布于印度、中南半岛、马来半岛、印度尼西亚至澳大利亚和新西兰。我国产 15 种 1 变种, 分布于台湾、广东、广西、海南和云南等省区。

属模式种: 蒜臭桤木 *Dysoxylum alliaceum* (Bl.) Bl.

分种检索表

1. 小叶老时两面均无毛。
2. 蒴果梨形、近梨形或球形, 圆锥花序非总状花序式。
3. 叶轴和叶柄无皮孔或皮孔不明显。

4. 花瓣外面被微柔毛、粉状微柔毛或红褐色紧贴的短柔毛。
 5. 小叶大, 长 15—35 厘米, 宽 8—15 厘米 1. 桫欏木 *D. excelsum* Bl.
 5. 小叶较小, 长 7—16 厘米, 宽 3—7 厘米
 6. 圆锥花序被黄褐色紧贴的短柔毛, 花瓣外被红褐色紧贴的短柔毛 2. 香港桫欏木 *D. hongkongense* (Tutch.) Merr.
 6. 圆锥花序无毛或被粉状微柔毛, 花瓣外被微柔毛。
 7. 圆锥花序被粉状微柔毛, 萼 4 浅裂, 裂片三角形 3. 红果桫欏木 *D. binectariferum* (Roxb.) Hook. f. ex Bedd.
 7. 圆锥花序无毛, 萼截头状, 裂片不明显 4. 杯萼桫欏木 *D. cupuliforme* H. L. Li
4. 花瓣外面无毛。
 8. 叶有小叶 20—23 枚 10b. 光叶海南桫欏木 *D. mollissimum* Bl. var. *glaberrimum* P. Y. Chun
 8. 叶有小叶 7—9 枚 5. 台湾桫欏木 *D. kusukusuense* (Hayata) Kanshira et Hatusima
3. 叶轴和叶柄明显有皮孔 6. 皮孔桫欏木 *D. lenticellatum* C. Y. Wu ex H. Li
2. 蒴果扁球形或圆梨形, 圆锥花序总状花序式。
 9. 蒴果扁球形, 花序长 30 厘米, 无毛 7. 总序桫欏木 *D. laxiracemosum* C. Y. Wu et H. Li
 9. 蒴果圆梨形, 花序长 1—3 厘米, 被黄毛粉状柔毛 8. 少花桫欏木 *D. oliganthum* C. Y. Wu ex H. Li
1. 小叶老时背面或仅于背面脉上被毛。
 10. 小叶背面全部被毛或沿背脉上密被柔毛。
 11. 小叶每边侧脉 25—30 条, 小叶背面被淡黄色长柔毛, 花瓣外面被柔毛 9. 多脉桫欏木 *D. lukii* Merr.
 11. 小叶每边侧脉在 15 条以下, 花瓣外面无毛或仅于顶部被黄色小粗毛。
 12. 花瓣外面无毛, 小叶背面被疏长毛, 中脉和侧脉上尤密。
 13. 叶有小叶 20—23 枚, 果 4 室 ... 10a. 海南桫欏木 *D. mollissimum* Bl. var. *mollissimum*
 13. 叶有小叶 5—9 枚, 果 5 室 11. 墨脱桫欏木 *D. medogensé* C. Y. Wu et H. Li
 12. 花瓣外面被疏短柔毛或顶部被黄色小粗毛, 小叶背面仅沿中脉和侧脉上密被微柔毛
 14. 花瓣外面被疏短柔毛, 蒴果直径 2.5—4 厘米 12. 密花桫欏木 *D. densiflorum* Bl. Miq.
 14. 花瓣顶部被黄色小粗毛或密被短柔毛, 蒴果直径 2—2.5 厘米或 4—6 厘米。
 15. 花瓣长 15 毫米, 顶端被黄色小粗毛, 蒴果直径 2—2.5 厘米 13. 兰屿桫欏木 *D. cumingianum* C. DC.
 15. 花瓣长 25 毫米, 顶端密被短柔毛; 蒴果直径 4—6 厘米 14. 大花桫欏木 *D. leyense* Merr.
 10. 小叶仅背面中脉上薄被小粗毛 15. 金平桫欏木 *D. kanehirai* (Sasaki) Kanehira et Hatusima