

柄长 2—8 毫米，被微柔毛。花序腋生，总状花序式，长仅 1—3 厘米，被黄色粉状柔毛，少花；花梗长 2—3 毫米，小苞片小，均被粉状柔毛；萼杯状，几截平，外面被粉状柔毛；花瓣 4，长 5—6 毫米，两面被粉状柔毛；雄蕊管长约 4 毫米，径约 3 毫米，外被粉状柔毛，内面无毛，边缘 8 齿；花药 8 枚，长圆形，下管齿互生；花盘环状，高约 1 毫米，边缘浅波状，无毛；子房和花柱被粗长毛，柱头头状，被粉状柔毛。果常单生，幼果黄绿色，圆梨形，具粗壮短柄，基部有宿萼。花期 3—7 月。

产云南屏边；生于海拔 1 200—1 400 米的湿润密林中。模式标本采自屏边。

9. 多脉槿木 (新拟) 陆氏槿木 (植物分类学报), 多脉葱臭木 (云南植物志), 赤木 (海南) 图版 21: 1—3


*Dysoxylum lukii* Merr. in Philip. Journ. Sci. 23: 247. 1923; in Lingn. Sc. Journ. 5: 103. 1927; Harms in Engl. u. prantl, Pflanzenfam. ed. 2. 19b (1): 163. 1940; H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 302. 1944; 侯宽昭、陈德昭, 植物分类学报 4: 15. 1955; 云南植物志 1: 250. 1977. — *D. lukii* Merr. var. *paucinervium* How et T. Chen. 植物分类学报 4: 15. 1955.

乔木，高 4—12 (—15) 米；树枝灰色，被短柔毛，顶生小枝密被淡黄色短柔毛。叶互生，疏离，长约 60 厘米，叶柄和叶轴密被柔毛；小叶 9—15 枚，通常互生，纸质，披针形或长圆状披针形，长 10—30 厘米，宽 3—9 厘米，先端渐尖，基部常偏斜，一侧圆形，另一侧楔形，叶面除中脉密被柔毛外近无毛或被疏散柔毛，背面被淡黄色长柔毛，侧脉每边 25—30 条，平展，近叶缘处弯拱连结，叶面叶脉微凹，背面明显突起。圆锥花序腋生，远短于叶，长约 20 厘米，分枝，被淡黄色短柔毛；花 4 基数，花梗长约 4 毫米或过之；花萼近盘状，直径 2.5 毫米，顶端不明显的浅裂，外被短柔毛；花瓣线状长圆形，长 6—7 毫米，宽约 2 毫米或不及，外面被柔毛；雄蕊管圆筒形，长约 5 毫米，无毛，管口有细钝齿；花药 8，长圆形，长约 1 毫米，内藏；花盘环状，高约 1 毫米，无毛，顶端有小钝齿；子房密被淡黄色长柔毛，花柱纤细，长 3—4 毫米，下部被长柔毛。蒴果倒卵状球形至梨形，长约 4 厘米，直径 3 厘米或过之，无毛，干时有皱纹；种子倒卵形，无假种皮。花期 5—7 月和 9—11 月，果期 10—11 月和翌年 3—4 月

产广东、广西、海南和云南等省区；生于中海拔山地的密林或疏林中。模式标本采自海南。

10. 海南槿木 (植物分类学报)

*Dysoxylum mollissimum* Bl., Bijdr. 175. 1825; Koord. et Valetton, in Bijdr. Booms. Java 3: 80. 1896; 邹寿青, 云南植物研究, 11 (2): 155. 1989; — *D. hainanense* Merr. in Lingn. Sc. Journ. 6: 280. 1928; 侯宽昭、陈德昭, 植物分类学报 4: 16. 1955; 海南植物志 3: 64. 1974; 云南植物志 1: 250, 图版 59: 3—4. 1977. — *D. filicifolium* H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 301. 1944.



图版 21 1—3. 多脉榿木 *Dysoxylum lukii* Merr. : 1. 果枝, 2. 叶面部分放大, 3. 叶背部分放大, 示毛被。

4—5. 香港榿木 *D. hongkongense* (Tutch.) Merr. : 4. 叶, 5. 果。6—8. 皮孔榿木 *D. lenticellatum* C. Y.

Wu ex H. Li. : 6. 花, 7. 花去花被, 8. 雄蕊管纵剖, 示花盘及雄蕊。(邓盈丰绘)