

柄长2—8毫米，被微柔毛。花序腋生，总状花序式，长仅1—3厘米，被黄色粉状柔毛，少花；花梗长2—3毫米，小苞片小，均被粉状柔毛；萼杯状，几截平，外面被粉状柔毛；花瓣4，长5—6毫米，两面被粉状柔毛；雄蕊管长约4毫米，径约3毫米，外被粉状柔毛，内面无毛，边缘8齿；花药8枚，长圆形，下管齿互生；花盘环状，高约1毫米，边缘浅波状，无毛；子房和花柱被粗长毛，柱头头状，被粉状柔毛。果常单生，幼果黄绿色，圆梨形，具粗壮短柄，基部有宿萼。花期3—7月。

产云南屏边；生于海拔1200—1400米的湿润密林中。模式标本采自屏边。

9. 多脉槿木 (新拟) 陆氏槿木 (植物分类学报), 多脉葱臭木 (云南植物志), 赤木 (海南) 图版21: 1—3

*Dysoxylum lukii* Merr. in Philip. Journ. Sci. 23: 247. 1923; in Lingn. Sc. Journ. 5: 103. 1927; Harms in Engl. u. prantl, Pflanzenfam. ed. 2. 19b (1): 163. 1940; H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 302. 1944; 侯宽昭、陈德昭, 植物分类学报 4: 15. 1955; 云南植物志 1: 250. 1977. — *D. lukii* Merr. var. *paucinervium* How et T. Chen. 植物分类学报 4: 15. 1955.

乔木，高4—12(—15)米；树枝灰色，被短柔毛，顶生小枝密被淡黄色短柔毛。叶互生，疏离，长约60厘米，叶柄和叶轴密被柔毛；小叶9—15枚，通常互生，纸质，披针形或长圆状披针形，长10—30厘米，宽3—9厘米，先端渐尖，基部常偏斜，一侧圆形，另一侧楔形，叶面除中脉密被柔毛外近无毛或被疏散柔毛，背面被淡黄色长柔毛，侧脉每边25—30条，平展，近叶缘处弯拱连结，叶面叶脉微凹，背面明显突起。圆锥花序腋生，远短于叶，长约20厘米，分枝，被淡黄色短柔毛；花4基数，花梗长约4毫米或过之；花萼近盘状，直径2.5毫米，顶端不明显的浅裂，外被短柔毛；花瓣线状长圆形，长6—7毫米，宽约2毫米或不及，外面被柔毛；雄蕊管圆筒形，长约5毫米，无毛，管口有细钝齿；花药8，长圆形，长约1毫米，内藏；花盘环状，高约1毫米，无毛，顶端有小钝齿；子房密被淡黄色长柔毛，花柱纤细，长3—4毫米，下部被长柔毛。蒴果倒卵状球形至梨形，长约4厘米，直径3厘米或过之，无毛，干时有皱纹；种子倒卵形，无假种皮。花期5—7月和9—11月，果期10—11月和翌年3—4月

产广东、广西、海南和云南等省区；生于中海拔山地的密林或疏林中。模式标本采自海南。

#### 10. 海南槿木 (植物分类学报)

*Dysoxylum mollissimum* Bl., Bijdr. 175. 1825; Koord. et Valetton, in Bijdr. Booms. Java 3: 80. 1896; 邹寿青, 云南植物研究, 11 (2): 155. 1989; — *D. hainanense* Merr. in Lingn. Sc. Journ. 6: 280. 1928; 侯宽昭、陈德昭, 植物分类学报 4: 16. 1955; 海南植物志 3: 64. 1974; 云南植物志 1: 250, 图版59: 3—4. 1977. — *D. filicifolium* H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 301. 1944.