

红色的假种皮。

产西藏墨脱（模式标本产地）；生于海拔 800—860 米的山坡阔叶林内和林缘。

12. 密花槿木（云南植物研究）

Dysoxylum densiflorum (Bl.) Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bot. 4: 9. 1868; Koord. et Valetton in Bijdr. Booms. Java 3: 41. 1896, et in Atlas Baunarter fig. 98. 1913; Backer in Fl. Java 2: 122. 1965; 邹寿青, 云南植物研究 11(2): 155. 1989; — *Epicharis densiflora* Bl. Bijdr. 167. 1825.

常绿乔木，高可达 25 米；树皮灰黄色，小块状剥落，内皮淡黄色。一年生小枝被柔毛，叶互生，长 35—46 厘米，叶轴密被黄色柔毛；小叶 7—15，互生或近对生，纸质，长圆形，长 9—16 厘米，宽 3—6 厘米，先端渐尖或短渐尖，基部偏斜，侧脉 10—14 对，顶生小叶倒卵状长圆形，小叶叶面仅沿中脉有毛，背面沿脉密被黄色柔毛；小叶柄长 4—6 毫米，密被柔毛。花组成总状花序，着生于二年生或多年生的老枝上；花序单生或 2—3（—10）个簇生，长 5—9 厘米，轴上密被柔毛。花梗长 2—4 毫米，密被柔毛。花淡黄色，长 8—10 毫米；萼杯状，高 3—4 毫米，裂片 4，三角形，外面被短柔毛，内面无毛；花瓣 4，长圆形，长 6—8 毫米，宽约 2 毫米，外面被疏短柔毛，内面无毛；雄蕊管长 6—8 毫米，径约 3 毫米，内外两面均被疏柔毛，先端具 8 个小裂片，每裂片端部又浅裂为 2 齿，花药 8 枚，略低于雄蕊管缘；花盘管状或呈坛状，高约 2 毫米，无毛，上面波状；子房内藏于花盘内，密被粗毛，4 室，花柱长 8 毫米，被疏长柔毛，柱头盾形。蒴果黄绿色，椭圆形或倒卵形，果皮密被黄色粉状短毛；近轴一侧常稍压扁，果长 4—6 厘米，直径 2.5—4 厘米。种子鲜红色，具僧帽状橙色假种皮。花期 4 月及 9 月，果期 4—5 月及 10—11 月。

产云南西双版纳（勐腊、景洪）；生于海拔 520—800 米的湿性热带季节性谷边、河边坡地的雨林中。分布于印度尼西亚、马来西亚。

13. 兰屿槿木（新拟） 兰屿桤木（台湾植物志）

Dysoxylum cumingianum C. DC. Monogr. phan. 1: 497. 1878; Merr. Enum. philip. Fl. Pl. 2: 362. 1923; Kanehira, Formos. Trees rev. ed. 326. 1936; 侯宽昭、陈德昭、植物分类学报 4: 16. 1955; H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 397. f. 146. 1936. et in Fl. Taiwan 3: 547. pl. 721. 1977.

小乔木，嫩枝密被粗毛，后无毛。叶为奇数羽状复叶，长 30 厘米，有小叶 7—9；小叶对生或互生，膜质，椭圆形或卵状椭圆形，长（5—）12—16 厘米，宽（3—）5—6 厘米，先端钝而急尖，基部楔形，有时圆形，偏斜，干时黄褐色，叶面无毛，背面沿中脉和侧脉上密被微柔毛，侧脉每边 12—14 条，背面稍凸起。圆锥花序线状，由枝上抽出，约与叶柄等长，长约 8 厘米，密被黄色粗毛；萼膜质，壶状，外被密粗毛，4 齿裂；花瓣 4，膜质，线状长椭圆形，长约 15 毫米，顶部被黄色小粗毛；雄蕊管圆柱状，无毛，狭