

红色的假种皮。

产西藏墨脱（模式标本产地）；生于海拔 800—860 米的山坡阔叶林内和林缘。

12. 密花榿木（云南植物研究）

Dysoxylum densiflorum (Bl.) Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bot. 4: 9. 1868; Koord. et Valetton in Bijdr. Booms. Java 3: 41. 1896, et in Atlas Baunarter fig. 98. 1913; Backer in Fl. Java 2: 122. 1965; 邹寿青, 云南植物研究 11(2): 155. 1989; — *Epicharis densiflora* Bl. Bijdr. 167. 1825.

常绿乔木，高可达 25 米；树皮灰黄色，小块状剥落，内皮淡黄色。一年生小枝被柔毛，叶互生，长 35—46 厘米，叶轴密被黄色柔毛；小叶 7—15，互生或近对生，纸质，长圆形，长 9—16 厘米，宽 3—6 厘米，先端渐尖或短渐尖，基部偏斜，侧脉 10—14 对，顶生小叶倒卵状长圆形，小叶叶面仅沿中脉有毛，背面沿脉密被黄色柔毛；小叶柄长 4—6 毫米，密被柔毛。花组成总状花序，着生于二年生或多年生的老枝上；花序单生或 2—3（—10）个簇生，长 5—9 厘米，轴上密被柔毛。花梗长 2—4 毫米，密被柔毛。花淡黄色，长 8—10 毫米；萼杯状，高 3—4 毫米，裂片 4，三角形，外面被短柔毛，内面无毛；花瓣 4，长圆形，长 6—8 毫米，宽约 2 毫米，外面被疏短柔毛，内面无毛；雄蕊管长 6—8 毫米，径约 3 毫米，内外两面均被疏柔毛，先端具 8 个小裂片，每裂片端部又浅裂为 2 齿，花药 8 枚，略低于雄蕊管缘；花盘管状或呈坛状，高约 2 毫米，无毛，上面波状；子房内藏于花盘内，密被粗毛，4 室，花柱长 8 毫米，被疏长柔毛，柱头盾形。蒴果黄绿色，椭圆形或倒卵形，果皮密被黄色粉状短毛；近轴一侧常稍压扁，果长 4—6 厘米，直径 2.5—4 厘米。种子鲜红色，具僧帽状橙色假种皮。花期 4 月及 9 月，果期 4—5 月及 10—11 月。

产云南西双版纳（勐腊、景洪）；生于海拔 520—800 米的湿性热带季节性谷边、河边坡地的雨林中。分布于印度尼西亚、马来西亚。

13. 兰屿榿木（新拟） 兰屿桫木（台湾植物志）

Dysoxylum cumingianum C. DC. Monogr. phan. 1: 497. 1878; Merr. Enum. philip. Fl. Pl. 2: 362. 1923; Kanehira, Formos. Trees rev. ed. 326. 1936; 侯宽昭、陈德昭、植物分类学报 4: 16. 1955; H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 397. f. 146. 1936. et in Fl. Taiwan 3: 547. pl. 721. 1977.

小乔木，嫩枝密被粗毛，后无毛。叶为奇数羽状复叶，长 30 厘米，有小叶 7—9；小叶对生或互生，膜质，椭圆形或卵状椭圆形，长（5—）12—16 厘米，宽（3—）5—6 厘米，先端钝而急尖，基部楔形，有时圆形，偏斜，干时黄褐色，叶面无毛，背面沿中脉和侧脉上密被微柔毛，侧脉每边 12—14 条，背面稍凸起。圆锥花序线状，由枝上抽出，约与叶柄等长，长约 8 厘米，密被黄色粗毛；萼膜质，壶状，外被密粗毛，4 齿裂；花瓣 4，膜质，线状长椭圆形，长约 15 毫米，顶部被黄色小粗毛；雄蕊管圆柱状，无毛，狭

裂，花药8，长椭圆形；花盘圆柱状，外面无毛，里面被倒毛；子房密被黄色长柔毛，4室，每室有胚珠1颗；花柱约与雄蕊管等长，中部被毛。蒴果球形，直径2—2.5厘米，红褐色，4—5瓣裂。

产台湾兰屿。分布于菲律宾。

14. 大花楸木（台湾）

Dysoxylum leytense Merr. in Philip. Journ. Sci. 8: 376. 1913; et Enum. Philip. Fl. Pl. 2: 364. 1923; Ching-en Chang in Form. Journ. Taiwan Prov. Pingt. Inst. Agr. 19: 16. 1977.

中等大乔木；小枝被短柔毛，后变无毛。叶长15—25厘米，叶轴无毛；小叶6—7对，对生或近对生，纸质，长圆状椭圆形，长11—15厘米，宽3—5厘米，先端短渐尖，基部多少不对称，侧脉每边14条，叶面无毛，背面沿中脉和侧脉上密被微柔毛；小叶柄长1—3毫米。花序着生于老枝或树干上，成簇生花序，甚短，有时成总状花序，花序轴长不超过1厘米；花梗长7—8毫米；花萼高脚杯状，长约10毫米，无毛，密布小微点，4裂，裂片不整齐，宽卵形，先端钝，长2—5毫米；花瓣4，长圆形，长约2.5厘米，宽3—4毫米，先端增厚，上端被紧密的短柔毛；雄蕊管与花瓣分离，外面无毛，内面稍被长柔毛，长约2厘米，宽3.5—4毫米，顶端8裂，花药8枚，无柄，与裂片互生；花盘无毛，长约3毫米，截平；子房被长柔毛，花柱下端被长柔毛，柱头盘状。果熟后近球形，直径4—6厘米。

产台湾兰屿。菲律宾也有。

15. 金平楸木（植物分类学报）

Dysoxylum kanehirai (Sasaki) Kanehira et Hatusima in Trans. Nat. Hist. Soc. Formos. 29: 25. 1939; 侯宽昭、陈德昭，植物分类学报 4: 17. 1955。——*Chisocheton kanehirai* Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formos. 18: 173. 1928; Ching En-chang in Form. Journ. Taiwan Prov. Pingt. Inst. Agr. 19: 15. 1977。——*C. erythrocarpus* auct. non Hisern. in Hook. f. (1875); Hayata et Kanehira, In. Pl. Formos. 10: 2. 1920——*C. tetrapetalus* auct. non DC.; Lui Sasaki et Keng in Quart. Journ. Taiwan Mus. 8 (4): 300. 1955; Chang in Quart. Taiwan Forest. 3 (2): 18. 1967.

乔木，直径50厘米。叶互生，偶数羽状复叶，长40—50厘米，有小叶14—18枚；小叶近对生或互生，近无柄，椭圆形，下部的较小，上部的较大，长8—14厘米，宽3.5—6.5厘米，先端渐尖而钝，基部极偏斜，两侧不等，上侧宽约3厘米，下侧宽约2厘米，叶面无毛，背面仅于中脉上薄被小粗毛，侧脉和网脉两面均明显。花未见。蒴果紫色，球形，直径约5厘米，果皮脆壳质，厚，3室，每室有种子1颗；种子平凸状，径约2.5厘米。果期7月。

产台湾兰屿与红头屿。分布于印度尼西亚。模式标本采自台湾红头屿。