

5—6月。

产云南南部；常见于海拔500—2000米的潮湿密林中。泰国、老挝、柬埔寨也有分布。

4. 黄叶树 (中国高等植物图鉴)

Xanthophyllum hainanense Hu in Journ. Arn. Arb. 6: 142. 1925; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine, Suppl. 1: 218. 1939; 海南植物志 1: 368, 图 189. 1964; 中国高等植物图鉴 2: 575, 图 2880. 1972; 广东植物志 2: 61, 图 41. 1991. — *X. racemosum* auct. non Chodat; G. W. Groff, Ding et E. H. Groff in Lingnan Agr. Rev. 2: 26. 1924; Merr. in Journ. Arn. Arb. 6: 134. 1925.

乔木，高5—20米；树皮暗灰色，具细纵裂；小枝圆柱形，纤细，无毛。叶片革质，卵状椭圆形至长圆状披针形，长4—12厘米，宽1.5—5厘米，先端长渐尖，基部楔形至钝，全缘，有时波状，两面均无毛，干时黄绿色，主脉及侧脉在两面突起，侧脉每边9—11条，弧曲，于边缘网结，细脉网状，上面明显，背面突起；叶柄长6—10毫米，具横纹，上面具槽。总状花序或小型圆锥花序腋生或顶生，长3—9厘米，总花梗及花梗密被短柔毛；花小，芳香，具披针形小苞片1枚，早落；萼片5，两面均被短柔毛，具缘毛，花后脱落，外面3枚小，卵形，长约2毫米，先端急尖，里面2枚大，椭圆形至圆形，长约4毫米，先端圆形；花瓣5，白黄色，分离，椭圆形或长圆状披针形，长约7毫米，先端钝，具细缘毛；雄蕊8，长4（—8）毫米，分离，下部被长柔毛，花药椭圆形，长约0.5毫米，基底着生；子房瓶状，密被柔毛，径约1毫米，具胚珠4粒，花柱长3—6毫米，基部疏被柔毛，柱头头状。核果球形，淡黄色，径1.5—2厘米，被柔毛，后变无毛，基部具1盘状环和花被脱落之疤痕，具种子1粒；果柄圆柱形，粗壮，长约5毫米，被短柔毛。种子近球形，淡黄色，径约8毫米。花期3—5月，果期4—7月。

产广东、海南、广西；生于海拔150—600米的山林中。模式标本采自海南五指山。该种木材坚硬致密，可供建筑用材。

族 2. 远志族 Trib. 2. POLYGALEAE Chodat

Chodat in Engl. u Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (4): 329. 1896.

萼片5，2轮列，外面3枚小，里面2枚大，常呈花瓣状；花瓣3，中下部常合生，龙骨瓣常具鸡冠状附属物；雄蕊8—4，花丝连合成向后开放的鞘，且与花瓣贴生；子房2室，中轴胎座，每室具1倒生胚珠。果实为翅果或蒴果，开裂或不开裂，有种子1—2粒；种子常具种阜。直立或攀援状灌木，或草本。

8属，分布于全世界，而以热带美洲和热带亚洲最多。我国产3属。