

米×5.5—7厘米，叶及小枝，花序仅被短柔毛或无毛，总状花序与叶对生或顶生；侧生花瓣基部内侧无色，鸡冠状附属物扇形，浅裂且席卷状，种子无毛。而本种之枝、叶柄，叶脉和花序均密被短柔毛，叶片较大，24—32厘米×8.5—9.8厘米；总状花序仅顶生，侧生花瓣基部内侧具1簇白色柔毛，鸡冠状附属物具短柄，条裂，不为扇状席卷式；种子被短柔毛。易于区别。

6. 肾果远志 (云南植物研究) 图版 33: 10—12

Polygala didyma C. Y. Wu in Acta Bot. Yunnan. 2 (1): 82, fig. 3: 4—6. 1980; 云南植物志 3: 275, 图版 76: 4—6. 1983; 云南种子植物名录, 上册 210. 1984; 陈书坤, 植物分类学报 29 (3): 206. 1991.

灌木或小乔木，高4.5米；小枝细，被短柔毛。单叶互生，叶片薄纸质，椭圆形，长(5—)10—16厘米，宽(2.5—)4.5—6.5厘米，先端渐尖，基部钝，全缘，叶面绿色，背面淡绿色，两面沿脉被短柔毛，余无毛，主脉上面凹，背面隆起，侧脉7—8对，上举，两面突起，于边缘处网结，细脉网状，两面略突起；叶柄长1厘米，上面具槽，被短柔毛。总状花序腋外生，纤细，较叶短，长约9厘米，无毛；花黄色，花被等不详。幼果肾形，宽远过于长，宽约13毫米，长约8毫米，顶端凹，基部心形，具花盘，边缘具狭翅，无毛。种子不详。 花果期8—9月。

产云南西北部(贡山，模式产地)；生于山坡林下，海拔1250米。

本种近于荷包山桂花 *P. arillata* Buch.-Ham. ex D. Don, 唯本种之叶片较大而薄，长10—16厘米，宽4.3—6.5厘米；蒴果肾形，顶端凹，基部心形，宽远过于长，长约8毫米，宽约13毫米，具狭翅而不同。

7. 球冠远志 (云南植物志)

Polygala globulifera Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 35: 486. 1903; 云南植物志 3: 271. 1983; 云南种子植物名录, 上册 211. 1984; Banerjee et al. in Bull. Bot. Surv. India 26 (1—2): 6. 1984; 陈书坤, 植物分类学报 29 (3): 206. 1991

7a. 球冠远志 (原变种)

var. *globulifera*

灌木，高0.8—2.5米；小枝无毛或被短柔毛。单叶互生，叶片膜质至薄纸质，倒卵形或椭圆形，长(10—)15—19厘米，宽5.5—7厘米，先端渐尖，基部圆形或阔楔形，全缘，具微缘毛，叶面绿色，背面淡绿色，两面沿脉被短柔毛，主脉上面凹陷，背面隆起，侧脉6—7对，背面突起，弧曲上升，于边缘处网结，细脉网状，明显；叶柄长约1厘米，被短柔毛。总状花序顶生或与叶对生，较叶短，长6—12厘米，被极短柔毛，花密集；花梗长8—12毫米，无毛或被短柔毛，具披针形苞片3枚，早落；萼片5，早落，具缘毛，外面3枚小，不等大，上面1枚囊状，长7—8毫米，两侧2枚卵形，长3—4毫米，宽约3毫米，内萼片2枚，大，花瓣状，斜倒卵形，长11—14毫米，宽约7毫米；