

16. 叶腋内有髯毛; 叶片顶端急尖..... 17b.

枯里珍五月茶 *A. pentandrum* (Blanco) Merr. var. *barbatum* (Presl) Merr.

1. 海南五月茶(海南植物志) 图版 14: 6—11

Antidesma hainanense Merr. in Philipp. Journ. Sci. Bot. 21 (4): 347. 1922; Gagnep. in Lec. Fl. Gén. Indo-Chiné 5: 507, fig. 65(1—8). 1926; Croiz. in Journ. Arn. Arb. 19: 134. 1938; 海南植物志 2: 119. 1965.

灌木, 高达 4 米; 枝条圆柱形; 除小枝和叶柄被污色绒毛外, 其余(叶片无毛除外)各部分均被短柔毛。叶片纸质, 长圆形、长椭圆形或倒卵状披针形, 长 7—15 厘米, 宽 3—4.5 厘米, 顶端短尾状渐尖, 有小尖头, 基部急尖或钝; 侧脉每边 7—10 条, 在叶面凹陷, 在叶背与网脉均明显凸起; 叶柄长约 5 毫米; 托叶披针形, 长约 5 毫米, 早落。雌雄花序均为腋生的总状花序, 长达 3 厘米; 苞片线形, 长 0.7 毫米; 雄花: 花梗长 0.3—0.4 毫米; 萼片 4, 圆形, 直径约 0.7 毫米; 雄蕊 4, 花丝着生在花盘上; 花盘垫状; 退化雌蕊长倒卵形; 雌花: 花梗长约 0.7 毫米; 萼片 4—5, 披针形或椭圆状长圆形, 长约 1 毫米; 花盘杯状; 子房卵圆形, 长于萼片 2 倍, 花柱顶生。核果卵形或近圆形, 直径 5—6 毫米。花期 4—7 月, 果期 8—11 月。

产于广东、海南、广西、云南, 生于海拔 300—1000 米山地密林中。越南、老挝也有。模式标本采自海南五指岭。

2. 河头山五月茶(新拟)

Antidesma pleuricum Tul. in Ann. Des. Sci. Nat. 213. 1851; Muell. Arg. in DC. Prodr. 15(2): 255. 1866; C. E. Chang in Journ. Phytogeogr. Taxon. 29(1): 9. 1981. — *Antidesma hontaushanense* C. E. Chang in For. Journ. Ass. Taiwan Prov. Inst. Agric. Pintung 6: 2. 1964; Hatusima in Mem. Fac. Agric. Kagoshima Univ. 7: 312. 1970.

灌木; 枝条圆柱形, 灰褐色; 小枝、顶芽、中脉、叶柄、花序和萼片外面均被短柔毛。叶片纸质, 椭圆形或卵状椭圆形, 长 8—13 厘米, 宽 3—7 厘米, 顶端渐尖, 基部圆至钝; 中脉上面凹陷, 下面凸起, 侧脉每边 6—7 条, 两面均凸起, 网脉明显; 叶柄长 1—1.5 厘米。花雌雄异株; 雄花组成腋生圆锥状穗状花序; 花序长 8—12 厘米; 小苞片倒卵形, 长 0.5 毫米, 顶端钝; 萼片 3—4, 宽卵形, 宽约 1 毫米; 雄蕊 4, 离生, 花丝长 0.8 毫米, 着生于花盘外围, 花药 2 室, 极叉开; 退化雌蕊被微柔毛。子房被短柔毛。核果近球状, 直径约 3 毫米, 被微柔毛。

产于我国台湾省兰屿河头山, 生于海拔 300 米山地疏林中或灌木丛中。分布于斯里兰卡和菲律宾。标本采自菲律宾。

3. 黄毛五月茶(海南植物志) 凌毅怀(广西), 木味水(广西博白) 图版 14: 1—5

Antidesma fordii Hemsl. in Journ. Linn. Scot. Bot. 26: 430. 1894; Pax et