

13. 蔓五月茶(新拟) 拟五月茶(拉汉种子植物名称)

Antidesma ambiguum Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. **81** (IV. 147. XV): 127. 1921; Gagnep. in Lec. Fl. Gén. Indo-Chiné **5**: 518. 1927.

灌木,高2米,蔓延性;枝条细长,幼时被短柔毛,老时毛被脱落。叶片膜质,椭圆形至倒披针形,长9—13厘米,宽3.5—4.5厘米,顶端急尖,基部楔形或宽楔形;叶背中脉被短柔毛至无毛,侧脉每边7—8条,疏离;叶柄长3—6毫米,被短柔毛;托叶线形或披针形,长2—4毫米。总状花序长4厘米,花序梗被短柔毛;苞片卵形,小,边缘有睫毛;花梗长1毫米;花萼3—4裂至中部,裂片半圆形,无毛;花盘环状;雄花3—4,着生于花盘裂片凹缺处,花药宽0.4毫米;退化雌蕊圆锥状,无毛;雌花:花萼4裂至中部;花盘杯状;子房卵圆形,无毛,花柱顶生。

产于云南蒙自和屏边等地,生于海拔1000—1600米山地疏林中。越南北部也有。模式标本采自越南河内。

14. 小肋五月茶(云南种子植物名录)

Antidesma costulatum Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr **81** (IV. 147. XV): 129. 1921.

小乔木,高达6米;幼枝、中脉、叶柄、托叶和花萼内面被短柔毛或柔毛外,其余均无毛。叶片膜质,长披针形,长10—15厘米,宽3.5—5厘米;侧脉每边7—10条;叶柄长10—15毫米;托叶线形,长3—4毫米。穗状花序顶生;雄花:花梗无或长1毫米;苞片倒卵形,长约1毫米;花萼4裂至中部,裂片近圆形;雄蕊4;雌花:花萼与雄花的相同;子房长圆形。核果椭圆形,长约5毫米,直径4毫米;果梗长3—4毫米。

产于四川、云南,生于海拔900—1500米山地疏林中。模式标本采自四川南川。

15. 五月茶(中国树木分类学) 污槽树(广东) 图版 18:1—6

Antidesma bunius (Linn.) Spreng. Syst. Veg. **1**: 826. 1825; Benth. Fl. Hongkong. 318. 1861; Muell. Arg. in DC. Prodr. **15**(2): 262. 1866; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **5**: 358. 1887; Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. **81** (IV. 147. XV): 160, fig. 12E, G. 1921; 陈嵘, 中国树木分类学 264. 1937; Back. et Bakh. f. Fl. Java **1**: 458, 460. 1963; 海南植物志 **2**: 120, fig. 354. 1965; Airy Shaw in Kew Bull. 26(2):353. 1972, **35** (3): 693. 1980, et in Kew Bull. Add. Ser. **4**: 209. 1975, **8**: 211. 1980; 中国高等植物图鉴 **2**: 583, 图 2895. 1972; Mandal et Panigrahi in Journ. Econ. Tax. Bot. **4**(1): 258. 1983. — *Stilago bunius* Linn. Mant. 122. 1767. — *Antidesma dallachyanum* Baill. in Adansonia **6**: 337. 1866. — *A. colletii* Craib in Bull. Misc. Inf. Kew **1911**: 461. 1911. — *A. thorelianum* Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France **59**: 124. 1923.

乔木,高达10米;小枝有明显皮孔;除叶背中脉、叶柄、花萼两面和退化雌蕊被短柔毛