

毫米;花盘环状,薄,顶端近全缘;子房卵圆形,2—3室,花柱长0.6—0.9毫米,基部合生,顶端2裂。蒴果浆果状,近圆球形,直径约4毫米,果皮淡白色;种子淡褐色,平滑,长1.9—2.5毫米,种脐内陷。花期4—7月,果期7—10月。

产于四川(得荣)和云南(墨江、德钦、中甸),生于海拔1000—1450米山坡灌丛中。分布于印度和斯里兰卡。模式标本采自印度南部。

9. 龙胆木属*——*Richeriella* Pax et Hoffm.

Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. **81**(IV. 147. XV): 30. 1921.

乔木。单叶互生,近革质,全缘,羽状脉,具短柄;托叶早落。花单性异株,无花瓣;雄花簇生成密集的团伞花序,再排成腋生、不分枝或少分枝的穗状花序,雌花组成短缩的总状花序;雄花:萼片5,覆瓦状排列;花盘腺体5,小,与萼片互生;雄蕊5,花丝分离,花药外向,纵裂;退化雌蕊2—3裂;雌花:少数;花梗短,果时伸长;萼片5,覆瓦状排裂;花盘环状;子房3室,每室有胚珠2颗,花柱3,分离,顶端浅2裂。蒴果,成熟时分裂为3个2瓣裂的分果片,外果皮纸质,内果皮角壳质,分果片开裂时外内果皮均分离;种子无种阜,胚乳薄,子叶宽而薄。

本属模式种:龙胆木 *Richeriella gracilis* (Merr.) Pax et Hoffm.

约2种,分布于印度、泰国、马来西亚至菲律宾。我国产1种。

1. 龙胆木(海南)

Richeriella gracilis (Merr.) Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. **81** (IV. 147. XV): 30. 1921; Merr. in Lingnan Sci. Journ. **14**: 22. 1935; 海南植物志 **2**: 115, fig. 351. 1965; Airy Shaw in Kew Bull. **26**(2): 328. 1972. — *Baccaurea gracilis* Merr. in Philipp. Journ. Sci. Suppl. **1**: 203. 1906, et Enum. Philipp. Fl. Pl. **2**: 411. 1923.

乔木,高达8米;树皮灰色;全株均光滑无毛。叶片纸质,长椭圆形、倒卵形或倒披针形,长9—16厘米,宽2.5—6厘米,顶端短渐尖或急尖,基部楔形;侧脉每边10—12条,下面凸起;叶柄长4—8毫米。雄花组成腋生穗状花序,花序长2—9厘米,花序轴略具棱;苞片小,卵状三角形,顶端急尖;雄花:花梗极短或无;萼片卵形,长1毫米,顶端钝;雄蕊伸出萼片之外,花丝丝状,长2毫米;退化雌蕊2裂;雌花组成短缩的总状花序,花序长1—1.5厘米;萼片与雄花的相同;花盘环状;子房卵形,3室,每室2颗胚珠,花柱3,分离,顶端浅2裂。蒴果宽卵形,长5毫米,直径6—8毫米,外果皮黄色,干后褐色,有网纹;种子长3.5毫米。花果期几乎全年。

* 龙胆木属(海南植物志),异名: 梨查木属(中国种子植物科属辞典)。

产于海南省,生于海拔 200—600 米山地荫湿阔叶林中。分布于菲律宾和泰国。模式标本采自菲律宾西南部。

10. 蓝子木属*——*Margaritaria* Linn. f.

Linn. f. Suppl. Pl. 66. 1781; Webster in Journ. Arn. Arb. 60:

407. 1979. — *Prosorius* Dalz. in Journ. Bot. Kew Misc. 4: 345.

1852. — *Phyllanthus* Sect. *Cicca* Subsect. *Margaritaria* (Linn. f.)

Muell. Arg. in DC. Prodr. 15(2): 414. 1866.

乔木或灌木。叶互生,通常二列,全缘,羽状脉;叶柄短;托叶全缘或有细齿,通常早落。花单性异株,簇生或单生于叶腋内或短枝上;无花瓣;雄花:花梗细长;萼片 4, 2 轮,不等大,通常外轮的较窄,膜质或纸质,全缘或有细齿,具中肋和分支脉纹;花盘环状,全缘或浅裂,贴生于萼片的基部,稀花盘退化或败育;雄蕊 4, 花丝离生或基部合生,花药外向,纵裂;花粉粒近圆球形,具 3 孔沟;无退化雌蕊;雌花:花梗圆柱形或扁平;萼片和花冠与雄花的相同;子房 2—6 室,花柱 2—6,分离或基部合生,顶端 2 裂,胚珠横生,每室 2 颗。蒴果,分裂成 3 个 2 裂的分果片或多少不规则裂开,外果皮肉质,内果皮厚,木质或骨质,平滑或皱;种子每室 2 颗,蓝色或淡蓝色,有光泽,胚乳丰富,白色,胚直或略弯,子叶薄而扁,比胚根长。

本属模式种: 珍子木 *Margaritaria nobilis* Linn. f.

约 14 种,分布于美洲、非洲、大洋洲及亚洲东南部。我国产 1 种,产于台湾和广西。

1. 蓝子木(新拟) 紫黄(台湾植物志) 图版 21: 1—2

Margaritaria indica (Dalz.) Airy Shaw in Kew Bull. 20: 387. 1966, 25: 492. 1971, 26: 308. 1972, et in Kew Bull. Add. Ser. 4: 175. 1975; Whitmore in Tree Fl. Malaya 2: 117. 1973; Webster in Journ. Arn. Arb. 60: 425. 1979. — *Prosorius indicus* Dalz. in Hook. Journ. Bot. Kew Gard. Misc. 4: 346. 1852; Airy Shaw in Kew Bull. 16: 342. 1963. — *Cicca sinica* Baill. Étud. Gén. Euphorb. 618. Pl. 24, fig. 28—33. 1858. — *Phyllanthus indicus* (Dalz.) Muell. Arg. in Linnaea 32: 52. 1863, et DC. Prodr. 15(2): 417. 1866; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 305. 1887; Beille in Lec. Fl. Gén. Indo-Chiné 5: 596. 1927; Kanehira, Formos. Trees rev. ed. 355, fig. 311. 1936; Back. et Bakh. f. Fl. Java 1: 342. 1963; Li, Woody Fl. Taiwan 436. 1963; Hsieh in Li, Fl. Taiwan 3: 490. 1977. — *Phyllanthus sinicus* (Baill.) Muell. Arg. in Linnaea 32: 50. 1863; Croiz. in Journ. Arn. Arb. 23: 31. 1942.

* 蓝子木属(新拟)。