

产于海南省,生于海拔 200—600 米山地荫湿阔叶林中。分布于菲律宾和泰国。模式标本采自菲律宾西南部。

10. 蓝子木属*——*Margaritaria* Linn. f.

Linn. f. Suppl. Pl. 66. 1781; Webster in Journ. Arn. Arb. 60:

407. 1979. — *Prosorius* Dalz. in Journ. Bot. Kew Misc. 4: 345.

1852. — *Phyllanthus* Sect. *Cicca* Subsect. *Margaritaria* (Linn. f.)

Muell. Arg. in DC. Prodr. 15(2): 414. 1866.

乔木或灌木。叶互生,通常二列,全缘,羽状脉;叶柄短;托叶全缘或有细齿,通常早落。花单性异株,簇生或单生于叶腋内或短枝上;无花瓣;雄花:花梗细长;萼片 4, 2 轮,不等大,通常外轮的较窄,膜质或纸质,全缘或有细齿,具中肋和分支脉纹;花盘环状,全缘或浅裂,贴生于萼片的基部,稀花盘退化或败育;雄蕊 4, 花丝离生或基部合生,花药外向,纵裂;花粉粒近圆球形,具 3 孔沟;无退化雌蕊;雌花:花梗圆柱形或扁平;萼片和花冠与雄花的相同;子房 2—6 室,花柱 2—6,分离或基部合生,顶端 2 裂,胚珠横生,每室 2 颗。蒴果,分裂成 3 个 2 裂的分果片或多少不规则裂开,外果皮肉质,内果皮厚,木质或骨质,平滑或皱;种子每室 2 颗,蓝色或淡蓝色,有光泽,胚乳丰富,白色,胚直或略弯,子叶薄而扁,比胚根长。

本属模式种: 珍子木 *Margaritaria nobilis* Linn. f.

约 14 种,分布于美洲、非洲、大洋洲及亚洲东南部。我国产 1 种,产于台湾和广西。

1. 蓝子木(新拟) 紫黄(台湾植物志) 图版 21: 1—2

Margaritaria indica (Dalz.) Airy Shaw in Kew Bull. 20: 387. 1966, 25: 492. 1971, 26: 308. 1972, et in Kew Bull. Add. Ser. 4: 175. 1975; Whitmore in Tree Fl. Malaya 2: 117. 1973; Webster in Journ. Arn. Arb. 60: 425. 1979. — *Prosorius indicus* Dalz. in Hook. Journ. Bot. Kew Gard. Misc. 4: 346. 1852; Airy Shaw in Kew Bull. 16: 342. 1963. — *Cicca sinica* Baill. Étud. Gén. Euphorb. 618. Pl. 24, fig. 28—33. 1858. — *Phyllanthus indicus* (Dalz.) Muell. Arg. in Linnaea 32: 52. 1863, et DC. Prodr. 15(2): 417. 1866; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 305. 1887; Beille in Lec. Fl. Gén. Indo-Chiné 5: 596. 1927; Kanehira, Formos. Trees rev. ed. 355, fig. 311. 1936; Back. et Bakh. f. Fl. Java 1: 342. 1963; Li, Woody Fl. Taiwan 436. 1963; Hsieh in Li, Fl. Taiwan 3: 490. 1977. — *Phyllanthus sinicus* (Baill.) Muell. Arg. in Linnaea 32: 50. 1863; Croiz. in Journ. Arn. Arb. 23: 31. 1942.

* 蓝子木属(新拟)。