

- 5. 珠子木 *P. anthopotamicum* (Hand.-Mazz.) Croiz.
 8. 枝条均匀生于茎上; 枝上的叶大小均匀, 叶片长 6—12 厘米, 宽 2.5—4.5 厘米, 下面浅绿色, 干后不呈苍白色; 侧脉每边 8—12 条; 叶脉、叶柄和托叶均无毛; 花梗长 1—2.5 厘米; 果被短柔毛 6. 宽脉珠子木 *P. lativenium* Croiz.
 7. 叶片基部两侧不对称; 雄花萼片 6 7. 龙州珠子木 *P. breynioides* P. T. Li
 6. 小枝两侧具明显的棱翅, 无毛。
 9. 叶片顶端具尾尖, 尾尖长 1.5 厘米, 基部宽楔形或钝; 侧脉每边 10—14 条; 雄花萼片和花盘腺体均 6 8. 尾叶珠子木 *P. caudatifolium* P. T. Li
 9. 叶片顶端急尖或渐尖, 基部圆; 侧脉每边 6—8 条; 雄花萼片和花盘腺体均 5
 9. 枝翅珠子木 *P. dunnianum* Lévl.
 1. 雄花萼片、花盘腺体和雄蕊均 4 (2. 崑岗珠子木组 *Sect. Tetrandrum* P. T. Li)
 10. 崑岗珠子木 *P. moi* (P. T. Li) P. T. Li

组 1. 珠子木组(原组)——*Sect. Phyllanthodendron*——*Sect. Pseudoactephilum* Croiz. in Journ. Arn. Arb. 23: 33, 35. 1942. ——*Sect. Calophyllum* Croiz. in Journ. Arn. Arb. 23: 34, 37. 1942.

雄花萼片 5—6; 雄蕊 3; 花盘腺体 5—6。

本组模式种: 泰国珠子木 *Phyllanthodendron mirabile* Hemsl.

约 15 种, 分布于马来半岛至中国。我国产 9 种, 分布于华南和西南。

1. 云南珠子木(植物研究) 滇珠子木(云南种子植物名录) 图版 33: 5—11

Phyllanthodendron yunnanense Croiz in Journ. Arn. Arb. 23: 36. 1942; P. T. Li in Bull. Bot. Res. 7(3):3. 1987.

灌木或小乔木, 高 2—7 米; 树皮褐色; 枝条圆柱形, 幼时被褐色短柔毛, 老渐毛被脱落。叶片薄革质, 椭圆形或长椭圆形, 长 6—12 厘米, 宽 2.5—4 厘米, 顶端渐尖, 基部钝至圆, 两面无毛或几无毛; 中脉和侧脉两面稍凸起, 侧脉每边 8—10 条, 斜升至叶缘前弯拱联结; 叶柄长 2—5 毫米, 初时被微毛, 后变无毛; 托叶卵状披针形, 外面被微毛。花 1—4 朵生于叶腋内; 花梗丝状, 长 1.5—4 厘米, 无毛, 基部有数枚小苞片; 雄花: 萼片 5, 卵状披针形, 长 3—5 毫米, 宽 1.5—1.8 毫米, 背部中肋突起, 无毛; 花盘腺体 5, 线形, 长约 0.8 毫米, 与萼片互生; 雄蕊 3, 花丝合生呈圆柱状, 花药长圆形, 药室纵裂, 药隔钻形; 雌花: 与雄花相似, 但较大; 萼片和花盘腺体 6, 子房圆球形, 直径约 2.5 毫米, 被短粗毛, 3 室, 花柱 3, 张开, 顶端不分裂。蒴果圆球状, 表面被短粗毛, 具有宿存的萼片和花柱; 果梗长 3—4 厘米, 无毛。花期 4—7 月, 果期 7—10 月。

产于贵州和云南(勐海、勐戛、耿马、孟连等地), 生于海拔 1 670—2 300 米山地疏林中。模式标本采自云南耿马。

2. 玫花珠子木(云南种子植物名录) 图版 33: 1—4

Phyllanthodendron roseum Craib et Hutch. in Bull. Misc. Inf. Kew 1910:



1—4. 玫花珠子木 *Phyllanthodendron roseum* Craib: 1. 花果枝; 2. 雌花; 3. 雌花展开; 4. 子房横切面, 示胚珠着生。5—11. 云南珠子木 *P. yunnanense* Croiz.: 5. 花枝; 6. 腋生花 (放大); 7. 雄花; 8. 雄花除去萼片, 示雄蕊合生及花盘腺体; 9. 雌花; 10. 雌花展开, 示雌蕊及花盘腺体; 11. 雌花除去萼片, 示雌蕊及花盘腺体。12—18. 尾叶珠子木 *P. caudatifolium* P. T. Li: 12. 花枝; 13. 雄花; 14. 雄蕊; 15. 雌花; 16. 雌蕊; 17. 子房横切面, 示胚珠着生; 18. 蒴果。(黄少容绘)