

23. 1910; Craib in Hook. Ic. Pl. 30, tab. 2935. 1911; Croiz. in Journ. Arn. Arb. 23: 35. 1942; P. T. Li in Bull. Bot. Res. 7(3): 3. 1987. — *Phyllanthodendron album* Craib et Hutch. in Bull. Misc. Inf. Kew 1910:279. 1910. — *P. roseum* Craib var. *glabrum* Craib ex Hosseus in Beih. Bot. Centralbl. 28(2): 406. 1911. — *Phyllanthus roseus* (Craib et Hutch.) Beille in Lec. Fl. Gén. Indo-Ghiné 5: 590. 1927; Airy Shaw in Kew Bull. 26: 323. 1972.

灌木或小乔木，高 3—6 米；枝条圆柱形；除枝条上部、子房和蒴果被短柔毛或微毛外，其他均无毛。叶片近革质，倒披针形、长圆形或椭圆形，长 7—16 厘米，宽 2—5 厘米，顶端渐尖，基部楔形或圆，干后褐红色，两面均无毛；中脉和侧脉在上面扁平，下面凸起，侧脉每边 9—12 条，在叶缘前网结；叶柄长 5—8 毫米；托叶卵状披针形，长约 4 毫米。花 3—6 朵簇生于叶腋内；雄花：花梗长约 1 厘米；萼片 5，披针形，长约 3 毫米，宽约 1.5 毫米，边缘膜质，背部中肋突起；花盘腺体 5，线形，长约 1.5 毫米，宽约 0.25 毫米，扁平，与萼片互生；雄蕊 3，花丝合生，长约 0.5 毫米，花药分离，长 0.75 毫米，药隔渐尖，长约 1 毫米；雌花：花梗长约 4 厘米，纤细；萼片 6，长圆状披针形，长约 3.5 毫米，宽约 2 毫米；花盘腺体 6，线形，长约 1.7 毫米，与萼片互生；子房近圆球形，3 室，每室有胚珠 2 颗，花柱 3，长约 0.5 毫米。蒴果近圆球状，直径约 1.5 厘米，粉红色，外果皮膜质，内果皮角质；种子长约 8 毫米，宽 3—3.5 毫米。

产于云南勐海等地，生于海拔 1 600 米山地常绿阔叶林中。分布于泰国、老挝、越南、马来西亚等地。模式标本采自泰国。

3. 岩生珠子木(植物研究) 图版 34: 6—10

Phyllanthodendron petraeum P. T. Li in Bull. Bot. Res. 7(3): 4. 1987.


灌木；茎灰褐色；枝条圆柱形，常集生于茎的上部；全株均无毛。叶片纸质，倒卵形，长 3—5 厘米，宽 2—3.5 厘米，顶端圆，有小短尖头，基部楔形或宽楔形；中脉上面扁平，下面稍凸起，侧脉每边 6—7 条，上面凸起，下面扁平，在叶缘前联结；叶柄长 3—7 毫米；花雌雄同株，单朵腋生；雄花：花梗长约 2 毫米；萼片 6，长圆状披针形，长约 5.5 毫米，宽约 2 毫米，背部中肋凸起；雄蕊 3，花丝合生，花药长圆形，2 室，纵裂，药隔钻状；花盘腺体 6，匙形；雌花：花梗长约 5 毫米；萼片和花盘腺体与雄花的相同；子房圆球状，3 室，每室有胚珠 2 颗，花柱 3，短，顶端 2 裂至中部。蒴果圆球状(幼果)，直径约 5 毫米，平滑，有宿存的萼片和花柱；果梗长约 5 毫米。

产于广西西南部，生于石灰岩山顶灌木丛中。模式标本采自龙州。

4. 圆叶珠子木(植物研究) 图版 34: 1—5

Phyllanthodendron orbicularifolium P. T. Li in Bull. Bot. Res. 7(3): 5. 1987.

灌木，高约 3.5 米；茎深褐色；枝条圆柱形；全株均无毛。叶片革质，圆形或近圆形，长



1—5.圆叶珠子木 *Phyllanthodendron orbicularifolium* P. T. Li: 1.花枝; 2.雄花; 3.雌蕊; 4.雌花; 5.雌蕊。6—10.岩生珠子木 *P. petraeum* P. T. Li: 6.花枝; 7.雄花; 8.雌蕊; 9.雌花; 10.花盘腺体。11—15.龙州珠子木 *P. breynioides* P. T. Li: 11.花枝; 12.雄花; 13.花盘腺体; 14.雌花; 15.萌果。(黄少容绘)