

Phyllanthodendron lativenium Croiz. in Journ. Arn. Arb. 23: 36. 1942; P. T. Li in Bull. Bot. Res. 7(3): 6. 1987.

灌木,高达3米;枝条具棱,被短柔毛。叶片纸质至薄革质,长椭圆形或倒卵形,长6—12厘米,宽2.5—4.5厘米,顶端渐尖或钝,基部楔形,两面均无毛;中脉和侧脉两面凸起,侧脉每边8—12条;叶柄长1—2毫米;托叶卵状披针形,长约3.5毫米,基部宽约2毫米,基部心形,着生于叶柄基部的两侧。花黄色,雌雄同株;雄花:花梗丝状,长约1厘米;萼片5,长椭圆形,长约3毫米,宽约1毫米,背部中肋突起,顶端具尾尖;雄蕊3,长约2毫米,花丝合生呈柱状;花盘腺体5,长约1.5毫米;雌花:花梗丝状,长2—2.5厘米,顶端稍厚;萼片6,长圆形,长约5毫米,宽约2毫米,顶端急尖;子房被短柔毛,花柱3。蒴果圆球状,被短柔毛,萼片和花柱宿存;果梗单生于叶腋内,长3—3.5厘米,纤细,无毛。花期5—7月,果期7—8月。

产于贵州(安龙、兴义、望谟、册亨等地),生于海拔800—1000米山地疏林中或山坡灌木丛中。模式标本采自南部观音洞。

7. 龙州珠子木(新拟) 图版 34: 11—15

Phyllanthodendron breynioides P. T. Li in Bull. Bot. Res. 7(3): 6. 1987.


直立灌木,高1—3米;枝条具棱,深灰色,节间比叶短;除枝条和叶柄被短柔毛外,其余均无毛。叶片纸质至厚纸质,二列,卵形至长圆形,长1—3厘米,宽5—15毫米,顶端钝,具小尖头,基部圆或浅心形,两侧不对称,上面深绿色,下面淡绿色;中脉两面稍凸起,侧脉每边5—7条,两面均扁平;叶柄长1—2毫米;托叶披针形,长约2毫米,着生于叶柄基部的两侧。花黄色,单生于叶腋内;雄花:花梗长约5毫米,基部具有许多小苞片;萼片6,长圆状披针形,长约3.5毫米,宽1—1.5毫米,顶端具尾尖,背部中肋突起;花盘腺体6,线形,长约2毫米;雄蕊3,花丝合生,花药长圆形,药隔披针形,与药室等长;雌花:花梗长约6毫米,基部具有小苞片;萼片6,长圆状披针形,长约3.5毫米,宽约1.5毫米,顶端具尾尖,背部中肋突起;花盘腺体6,线形,长约2毫米;子房圆球形,直径约1毫米,花柱3,基部合生,蒴果圆球状,直径约1厘米。花期7—8月,果期8—12月。

产于广西(龙州、德保等地),生于丘陵山地疏林中或石岩灰山地灌木丛中。模式标本采自龙州。

8. 尾叶珠子木(植物研究) 图版33: 12—18

Phyllanthodendron caudatifolium P. T. Li in Bull. Bot. Res. 7(3): 7. 1987.

灌木,高约2米;枝条具棱翅;全株均无毛。叶片厚纸质,倒卵形或长圆形,长5.5—12厘米,宽2—3.5厘米,顶端具尾尖,尾尖长达1.2厘米,基部宽楔形或钝;中脉和侧脉两面稍凸起,侧脉每边10—14条,近水平斜升至叶缘弯拱联结;叶柄长2—4毫米;托叶披针形,长约4毫米。花白色,雌雄同株,1—3朵生于叶腋内;花梗丝状,长2—2.5厘米,基部



1—5.圆叶珠子木 *Phyllanthodendron orbicularifolium* P. T. Li: 1.花枝; 2.雄花; 3.雌蕊; 4.雌花; 5.雌蕊。6—10.岩生珠子木 *P. petraeum* P. T. Li: 6.花枝; 7.雄花; 8.雌蕊; 9.雌花; 10.花盘腺体。11—15.龙州珠子木 *P. breynioides* P. T. Li: 11.花枝; 12.雄花; 13.花盘腺体; 14.雌花; 15.萌果。(黄少容绘)