

有数枚小苞片;小苞片卵状三角形;雄花:萼片6,披针形,长约4毫米,背部中肋突起;花盘腺体6,线形,长约2毫米,宽0.2毫米,与萼片互生;雄蕊3,花丝合生呈柱状,花药分离,长圆形,2室,药隔钻状;雌花:萼片6,披针形,长约5毫米,背部中肋突起;花盘腺体6,线形,长约2毫米;子房圆球形,花柱3,顶端2裂。蒴果圆球状,直径约1.5厘米,萼片和花柱宿存;果梗长达4厘米,顶端膨大。花期5—7月,果期7—9月。

产于贵州兴义和广西隆林等地,生于海拔800—1300米山地疏林中或石灰岩山地灌木丛中。模式标本采自贵州兴义顶效坡岗。

9. 枝翅珠子木(植物研究) 枝翅叶下珠(广西植物) 图版 35: 5—8

Phyllanthodendron dunnianum Lévl. in Fedde, Rpe. Spec. Nov. 9:324. 1911, et Fl. Kouy-Tchéou 166. 1914; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7 (2): 224. 1931; Croiz. in Journ. Arn. Arb. 23: 37. 1942; Lauener in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 40: 484. 1983; P. T. Li in Bull. Bot. Res. 7(3): 8. 1987. —*Phyllanthodendron cavaleriei* Lévl. in Fedde, Rep. Spec. Nov. 9 454. 1911, et Fl. Kouy-Tchéou 166. 1914. —*P. dunnianum* Lévl. var. *hypoglaucum* Lévl. Fl. Kouy-Tchéou 166. 1914. —*Phyllanthus dunnianus* (Lévl.) Hand.-Mazz. ex Rehd. in Journ. Arn. Arb. 14: 230. 1933; P. T. Li in Guihaia 3(3): 169. 1984.

灌木或小乔木,高2—6米;茎圆柱形;枝条两侧具翅;全株均无毛。叶片革质或厚纸质,椭圆形,卵形、长圆形或卵状披针形,长2.5—10厘米,宽1.5—4厘米,顶端急尖或短渐尖,基部圆形;侧脉每边6—8条,叶缘前联结;叶柄长约2毫米;托叶卵状披针形,长约3毫米。花1—2朵腋生,雌雄同株;雄花:花梗长3—4毫米;萼片5,卵状椭圆形,长约5毫米,具脉纹,顶端具芒尖;花盘腺体5,线形,与萼片互生;雄蕊3,花丝合生,花药分离,长圆形,药隔顶端钻状;雌花:花梗约5毫米;萼片6,与雄花的相同;花盘腺体6;子房卵圆形,3室,每室有胚珠2颗,花柱3。蒴果圆球状,直径1—1.5厘米;果梗长5—6毫米。花期5—7月,果期7—10月。

产于广西、贵州、云南等省区,生于山地阔叶林中或石灰岩山地灌木丛中。模式标本采自贵州罗甸。

组2. 巽岗珠子木组——Sect. *Tetrandrum* P. T. Li in Bull. Bot. Res. 7 (3): 8. 1987. 雄花萼片、雄蕊和花盘腺体均为4。

本组模式种: 巽岗珠子木 *Phyllanthodendron moi* (P. T. Li) P. T. Li

1种,产于中国广西。

10. 巽岗珠子木(植物研究) 巽岗叶下珠(广西植物)

Phyllanthodendron moi (P. T. Li) P. T. Li in Bull. Bot. Res. 7(3):9. 1987. —*Phyllanthus moi* P. T. Li in Guihaia 3(3): 167, fig. 1. 1983.



1—4. 珠子木 *Phyllanthodendron anthopotamicum* (Hand.-Mazz.) Croiz.: 1. 花枝; 2. 雄花; 3. 雄蕊; 4. 雌花。 5—8. 枝翅珠子木 *P. dunnianum* Lévl.: 5. 花枝; 6. 雄花 7. 雄蕊; 8. 雌花。

(黄少容绘)