

宽 0.4 毫米,内向;雌穗状花序圆柱状,腋生,花序梗长 2—6 毫米;雌花:萼片 4,三角形,长约 1 毫米,内面基部被微毛;子房倒卵形,长约 6 毫米,2 室,无毛,花柱 2,顶端深 2 裂。蒴果卵圆形或椭圆形,长 9—10 毫米,宽约 5 毫米,内有种子通常 1 颗。

产于海南、广西和云南富宁等地,生于海拔 750 米山地疏林中。分布于印度、缅甸、泰国、越南、老挝、柬埔寨等。模式标本采自印度东部。

4. 云南银柴(拉汉种子植物名称) 橄树(海南),铁车木(广东茂名),云南大沙叶(广西植物名录) 图版 36:1—5

Aporosa yunnanensis (Pax et Hoffm.) Metc. in Lingnan Sci. Journ. 10: 486. 1931; Merr. et Chun in Sunyatsenia 2: 33. 1934; Merr. in Journ. Arn. Arb. 19: 40. 1938; 海南植物志 2: 117. 1965; Airy Shaw in Kew Bull. 26: 218. 1972. —*Aporosa wallichii* Hook. f. var. *yunnanensis* Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. 81 (IV. 147. XV): 90. 1921.


小乔木,高达 8 米;枝条光滑无毛。叶片膜质至薄纸质,长圆形、长椭圆形、长卵形至披针形,长 6—20 厘米,宽 2—8 厘米,顶端尾状渐尖,基部钝或宽楔形,全缘或边缘有稀疏腺齿,上面深绿色,无毛,密被黑色小斑点,下面淡绿色,幼时仅叶脉上被稀疏柔毛,老渐无毛;侧脉每边 5—7 条,未达叶缘而弯拱联结,两面均明显而下面凸起;叶柄长 1—1.3 厘米,顶端两侧各具有 1 个小腺体;托叶早落。雄穗状花序长 2—4 厘米;苞片三角形,宽 1.2 毫米,外面基部及边缘被短柔毛;雌穗状花序长达 8 毫米;雄花:萼片 3—5,长倒卵形,外面被柔毛;雄蕊 2;雌花:萼片通常 3,三角形,顶端急尖,外面被柔毛;子房椭圆形,无毛,2 室,每室有胚珠 2 颗,花柱 2,顶端 2 裂。蒴果近圆球状,长 8—13 毫米,直径 6—8 毫米,成熟时红黄色,无毛,顶端常有宿存的花柱;种子椭圆形,黑褐色。花果期 1—10 月。

产于江西、广东、海南、广西、贵州和云南等省区,生于海拔 200—1500 米山地密林中、林缘或溪旁灌木丛中。分布于印度、缅甸、越南等地。模式标本采自云南思茅。

14. 木奶果属*——*Baccaurea* Lour.

Lour. Fl. Cochinch. 661. 1790; Endl. Gen. Suppl. 2: 91. 1842; Muell. Arg in DC. Prodr. 15(2): 456. 1866; Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 3: 283. 1880; Pax in Engl. et Prantl, Pflanzenfam. 3(5): 50. 1890; Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. 81 (VI. 147. XV): 45. 1921; Airy Shaw in Kew Bull. Add. Ser. 4: 43. 1975.

* 木奶果属(中国种子植物科属辞典),异名: 黄果树属(中国植物科属检索表)。



1—5. 云南银柴 *Aporosa yunnanensis* (Pax et Hoffm.) Metc.: 1. 雄花枝; 2. 果枝; 3. 雄花蕾; 4. 雄花; 5. 蒴果。6—12. 毛银柴 *A. villosa* (Lindl.) Baill.: 6. 果枝; 7. 雄花枝; 8. 雄花蕾; 9. 雌花; 10. 雌花; 11. 子房横切面, 示胚珠着生; 12. 蒴果。(黄少容绘)