

尖,基部楔形,全缘或浅波状,上面绿色,下面黄绿色,两面均无毛;侧脉每边 5—7 条,上面扁平,下面凸起;叶柄长 1—4.5 厘米。花小,雌雄异株,无花瓣;总状圆锥花序腋生或茎生,被疏短柔毛,雄花序长达 15 厘米,雌花序长达 30 厘米;苞片卵形或卵状披针形,长 2—4 毫米,棕黄色;雄花:萼片 4—5,长圆形,外面被疏短柔毛;雄蕊 4—8;退化雌蕊圆柱状,2 深裂;雌花:萼片 4—6,长圆状披针形,外面被短柔毛;子房卵形或圆球形,密被锈色糙伏毛,花柱极短或无,柱头扁平,2 裂。浆果状蒴果卵状或近圆球状,长 2—2.5 厘米,直径 1.5—2 厘米,黄色后变紫红色,不开裂,内有种子 1—3 颗;种子扁椭圆形或近圆形,长 1—1.3 厘米。花期 3—4 月,果期 6—10 月。

产于广东、海南、广西和云南,生于海拔 100—1300 米的山地林中。分布于印度、缅甸、泰国、越南、老挝、柬埔寨和马来西亚等。模式标本采自越南。

果实味道酸甜,成熟时可吃。木材可作家具和细木工用料。树形美观,可作行道树。

2. 多脉木奶果(新拟)

Baccaurea motleyana (Muell. Arg.) Muell. Arg. in DC. Prodr. **15** (2): 461. 1866; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **5**: 371. 1887; Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. **81** (VI. 147. XV): 53. 1921; Ridl. Fl. Malay Penins. **3**: 250. 1924; Back. et Bakh. f. Fl. Java **1**: 454. 1963; Airy Shaw in Kew Bull. **26**: 220. 1972. —*Pierardia motleyana* Muell. Arg. in Flora **47**: 516. 1864.

乔木,高 6—10 米;枝条圆柱形,上部被锈色长柔毛。叶片纸质,椭圆形或椭圆状披针形,长 20—35 厘米,宽 7.5—17 厘米,顶端短渐尖或急尖,基部圆或浅心形,叶面中脉和叶背被短柔毛;侧脉每边 12—16 条,平行,细脉梯形;叶柄长 5—8 厘米,被短柔毛;托叶披针形,长约 8 毫米,通常早落。总状圆锥花序腋生或茎生,长 13—25 厘米;苞片披针形;雄花:花梗长达 1.5 毫米,被短柔毛;萼片长卵形,长 1—1.5 毫米,顶端急尖;雄蕊 4—6;退化雌蕊顶端凹缺,被短柔毛;雌花:花梗长达 2 毫米;萼片长圆形,长 4—5 毫米;子房卵珠状或圆珠状,3 室,被绢毛。浆果状蒴果卵珠状或圆球状,长 2.5—3 厘米,不开裂,被疏短柔毛;种子每室 1 个,长约 1.5 厘米。

我国云南西双版纳等地有栽培。产于泰国、马来西亚和印度尼西亚等。模式标本采自印度尼西亚加里曼丹。

15. 算盘子属*——*Glochidion* J. R. et G. Forst., nom. cons.

J. R. et G. Forst. Charact. Gen. Pl. 113, tab. 57. 1776. —*Bra-*
dleja Banks ex Gaertn. Fruct. Sem. Pl. **2**: 127. tab. 109. 1791.

* 算盘子属(种子植物名称),别名:瓜算盘子属(植物学名词审查本),馒头果属(中国树木分类学),神子木属(植物学大辞典)。