

共长 1 毫米,圆柱状,稍厚,顶端具有 8 条纵沟。花期 10 月。

台湾特产,生于山地林中。

17. 台湾算盘子(新拟)

Glochidion kusukusense Hayata, Icon. Pl. Formos. 9: 96. 1920.


灌木;小枝纤细;全株无毛。叶片纸质,披针形,长 4—6.5 厘米,宽 1.5—2 厘米,顶端渐尖,有短尖头,基部急尖,两侧不等大;叶柄长约 5 毫米。雌雄异株;雄花几朵簇生于叶腋内;花梗纤细,长约 5 毫米;萼片 6, 2 轮,外轮的较大,长圆形,长约 1.5 毫米,宽约 1 毫米,顶端急尖,内轮的较小;雄蕊 3,合生呈圆锥状,长约 0.7 毫米。

产于台湾,生于山地疏林下。模式标本采自高士佛山地。

18. 甜叶算盘子(广西植物名录) 菲岛算盘子(拉汉种子植物名称), 菲岛馒头果(台湾木本植物志), 甜叶木(广西) 图版 46:6—10

Glochidion philippicum (Cav.) C. B. Rob. in Philipp. Journ. Sci. Bot. 4: 103. 1909; Merr. Enum. Philipp. Fl. Pl. 2: 401. 1923; Airy Shaw in Kew Bull. 27: 58, 68, 73. 1972, 31: 349. 1976, 35: 638. 1980, et Kew Bull. Add. Ser. 4:130. 1975; Liu, Ligneous Pl. Taiwan 404. 1976. — *Bradleya philippica* Cav. Icon. 3: 48, tab. 371. 1797. — *B. philippensis* Willd. Sp. Pl. 4:592. 1805, — *Glochidion philippinense* Benth. Fl. Hongkong. 314. 1861; 海南植物志 2:125. 1965. — *G. compressicaule* Kurz ex Teijsm. et Binnend. in Nat.Tijdschr. Ned. Ind. 27: 45. 1864. — *Phyllanthus philippinensis* (Benth.) Muell. Arg. in Flora 48: 376. 1865, et in DC. Prodr. 15(2): 295. 1866. — *P. compressicaulis* (Kurz ex Teijsm. et Binnend.) Muell. Arg. in Flora 48: 376. 1865, et in DC. Prodr. 15(2): 295. 1866. — *P. quercinus* Muell. Arg. in DC. Prodr. 15(2): 306. 1866. — *P. kurzianus* Muell. Arg. in DC. Prodr. 15 (2): 1272. 1866. — *G. quercinum* (Muell. Arg.) Boerl. Handl. Fl. Nederl. Ind. 1(2): 276. 1900. — *G. formosanum* Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 20(3): 20, tab. 2G. 1904. — *G. album* auctt. non (Blanco) Boerl.: Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 30(1): 264. 1911; Kanehira, Formos. Trees rev. ed. 342, fig. 296. 1936.

乔木,高达 12 米;小枝幼时被短柔毛,老渐无毛。叶片纸质或近革质,卵状披针形或长圆形,长 5—15 厘米,宽 2.5—5.5 厘米,顶端渐尖至钝,基部急尖或宽楔形,通常偏斜,上面深绿色,干后暗褐色或褐色,两面均无毛;侧脉每边 6—8 条;叶柄长 4—6 毫米;托叶卵状三角形,长 1—1.5 毫米。花 4—10 朵簇生于叶腋内;雄花:花梗长 6—7 毫米;萼片 6,长圆形或倒卵状长圆形,长 1.5—2.5 毫米,无毛,雄花 3,合生呈圆柱状;雌花:花梗长 2—4 毫米;萼片与雄花的相同;子房圆球状,被柔毛,4—7 室,花柱合生呈粗而短的圆锥状。蒴果扁球状,直径 8—12 毫米,高 4.5—5.5 毫米,顶端中央凹陷,被稀疏白色柔毛,边缘具



1—5. 四裂算盘子 *Glochidion assamicum* (Muell. Arg.) Hook. f.: 1. 花枝; 2—3. 雄花; 4. 雄蕊;
 5. 蒴果。6—10. 甜叶算盘子 *P. philippicum* (Cav.) C. B. Rob.: 6. 花枝; 7—8. 雄花; 9. 雄蕊; 10.

蒴果。(黄少容绘)

8—10 条纵沟;花柱宿存;果梗长 3—8 毫米。花期 4—8 月,果期 7—12 月。

产于福建、台湾、广东、海南、广西、四川和云南等省区,生于山地阔叶林中。分布于菲律宾、马来西亚和印度尼西亚等。模式标本采自菲律宾。

19. **圆果算盘子**(中国经济植物志) 山柑树(海南),山柑算盘子(海南植物志),栗叶算盘子(广东药用植物手册) 图版 47:5—9

Glochidion sphaerogynum (Muell. Arg.) Kurz, For. Fl. Brit. Burma 2: 346. 1877; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 317. 1887; Airy Shaw in Kew Bull. 26 (2): 280. 1972; P. T. Li in Acta Phytotax. Sin. 26: 63. 1988. — *Phyllanthus sphaerogynus* Muell. Arg. in Flora 48: 375. 1865, et in DC. Prodr. 15 (2): 293. 1866. — *Glochidion fagifolium* Miq. Pl. Hobenack. 1468. (manuscr. ined.) — *P. fagifolius* (Miq.) Muell. Arg. in Flora 48: 373. 1865, et in DC. Prodr. 15 (2): 288. 1866. — *G. fagifolium* Miq. ex Bedd. Forest. Man. Bot. 193. 1872. — *G. fagifolium* (Miq.) Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 312. 1887; Beille in Lec. Fl. Gén. Indo-Chiné 5: 617. 1927; 海南植物志 2:125. 1965.

乔木或灌木,高 4—10 米;树皮灰白色;小枝具棱,无毛。叶片纸质或近革质,卵状披针形,披针形或长圆状披针形,长 7—10 厘米,宽 1.5—3.5 厘米,顶端渐尖,基部急尖,两侧通常略不相等,两面无毛,上面绿色,下面浅绿色,干后灰褐色;侧脉每边 6—8 条;叶柄长 5—8 毫米;托叶近三角形,长 2—3 毫米。花簇生于叶腋内,雌花生于小枝上部,雄花则在下部,或雌花和雄花同生于小枝中部的叶腋内;雄花:花梗长 6—8 毫米;萼片 5—6,倒卵形或椭圆形,长约 2 毫米,淡黄色;雄蕊 3,合生,药隔尖;雌花:花梗长 2—3 毫米;萼片 6,卵形或卵状三角形,外轮 3 片较大而厚,长约 1 毫米;子房 4—6 室,无毛,上部为花柱所包,花柱合生呈扁珠状,宽约 2 毫米,约为子房宽的 2 倍。蒴果扁球状,直径 8—10 毫米,高约 4 毫米,顶端凹陷,边缘有 8—12 条纵沟,顶端具有扁球状的花柱宿存。花期 12 月—翌年 4 月,果期 4—10 月。

产于广东、海南、广西和云南等省区,生于海拔 100—1 600 米山地疏林中或旷野灌木丛中。分布于印度、缅甸、泰国、越南等。模式标本采自印度东部。

树皮含鞣质 14.31%。枝叶供药用,有清热解毒之效,可治感冒发热、暑热口渴、口腔炎等;外治刀伤出血、骨折;外洗治湿疹、疮疡溃烂等。

20. **青背叶算盘子**(植物分类学报) 淡红脉算盘子(植物分类学报) 图版 45:4—6

Glochidion thomsonii (Muell. Arg.) Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 318. 1887; P. T. Li in Acta Phytotax. Sin. 26: 62. 1988. — *Phyllanthus thomsonii* Muell. Arg. in Flora 48: 375. 1865, et in DC. Prodr. 15(2): 293. 1866. — *Glochidion rubidulum* Chin in Acta Phytotax. Sin. 18(2): 251, fig. 1(4—6). 1980; 西藏植物志 3:67, 图 23(3—4). 1986.