

下弯垂,叶片鲜时近肉质,干后近革质或厚纸质,匙形、倒卵状长圆形或卵形,有时长圆形,长 4.5—16.5 厘米,宽 2.5—6.3 厘米,顶端浑圆或钝,有小凸尖,稀凹缺,基部楔形或钝,稀圆形,上面鲜时深绿色,叶脉处呈灰白色,干时黄白色,通常无毛,有时下面基部有腺状短柔毛,后变无毛;中脉和侧脉在鲜叶时扁平,干后中脉两面均凸起,侧脉每边 6—9 条,下面稍凸起;叶柄长 2—5 毫米,初时被腺状短柔毛,老渐无毛;托叶三角状耳形,着生于叶柄基部两侧,长 4—8 毫米,基部宽 3—4 毫米,宿存。花红色或紫红色,雌雄同枝,2—5 朵簇生于落叶的枝条中部或下部,或茎花,有时组成短聚伞花序,花序长达 15 毫米;花序梗短而粗壮,着生有许多披针形的苞片;苞片长约 2 毫米;雄花:花梗丝状,长 3—5 毫米;萼片 6,2 轮,近等大,倒卵形,长 2—3 毫米,宽约 1.5 毫米;花盘腺体 6,与萼片对生;雄蕊 3,花丝合生呈短柱状;雌花:花梗长约 2—3 毫米;萼片与雄花的相同;无花盘;子房近圆球状,直径约 1 毫米,3 室,花柱 3,顶端 2 裂。花期 2—10 月。

福建、广东、广西等栽培于药圃、公园、村边及屋旁。原产于越南北部,马来半岛有栽培。模式标本采自越南河内。

叶可药用,可治咳嗽、喉痛、急性支气管炎等。

4. 茎花守宫木(广西植物) 图版 50: 4—9

Sauropus bonii Beille in Lec. Fl. Gén. Indo-Chiné 5:651. 1927; Airy Shaw in Kew Bull. 26(2):334. 1972; P. T. Li in Guihaia 3(3):168. 1983, et in Acta Phytotax. Sin. 25:133. 1987.

灌木,高达 3 米;茎皮灰色;枝条具棱,绿色;全株无毛。叶片纸质,长椭圆形、卵状披针形或倒披针形,长 7—14 厘米,宽 2.5—5 厘米,顶端渐尖或短渐尖,基部宽楔形,上面深绿色,下面淡绿色;侧脉每边 7—11 条,斜升至叶缘前弯曲连结;叶柄长 3—6 毫米;托叶三角形,长 3—5 毫米,着生于叶柄基部两侧。总状聚伞花序着生于茎的下部或基部,长 6—15 厘米,常下垂,雌雄同序;花序梗和花梗的基部均分别有覆瓦状排列的苞片和小苞片;雄花:花梗丝状,长 2—4 毫米;花萼杯状,边缘波状,直径 3—5 毫米,膜质,淡黄色,有红色斑纹;花盘 6 浅裂,贴生于花萼上;雄蕊 3,合生呈柱状,花药长圆形;雌花:花梗长 2—3 毫米;花萼钟状,直径 3—5 毫米,6 裂,裂片匙形或倒卵形,2 轮,外轮的长 3—5 毫米,内轮的长 2—4 毫米;子房卵圆形或圆球形,3 室,每室 2 颗胚珠,花柱 3,分离,顶端 2 裂,裂片向下弯。蒴果近圆球状,直径约 2 厘米,高约 1.5 厘米,6 月裂。

产于广西龙州和天峨等地,生于海拔 200—500 米石灰岩山地林下或山坡灌木丛中。分布于越南和泰国。模式标本采自越南河内。

5. 网脉守宫木(植物分类学报) 图版 51: 1—2

Sauropus reticulatus X. L. Mo ex P. T. Li in Acta Phytotax. Sin. 25: 133. 1987.

灌木,高约 2 米,全株无毛。叶片革质,长圆形、长椭圆形或椭圆状披针形,长 10—16



1—3. 龙棚叶 *Sauropus spatulifolius* Beille: 1. 花枝; 2. 雄花; 3. 雌花。4—9. 茎花守宫木 *S. bonii* Beille: 4. 花枝; 5. 雄花; 6. 合生雄蕊; 7—8. 雌花; 9. 子房横切面, 示胚珠着生。(黄少容绘)