

厘米,宽4—5厘米,顶端渐尖,基部宽楔形至钝;侧脉每边8—10条,与网脉两面均明显,且微凸起;叶柄长约5毫米;托叶三角形,常早落。蒴果扁球状,直径约2厘米,高约1.5厘米,单生于叶腋;果梗长约3厘米;宿存萼片6,宽倒卵形,长约5毫米,宽2.5毫米,较厚,宿存的花柱3,分离,顶端2裂。

产于广西靖西和云南泸西等地,生于海拔500—800米石灰岩山地疏林下或山坡灌木丛中。模式标本采自广西靖西。

6. 长梗守宫木(海南植物志) 图版 51: 4

Sauropus macranthus Hassk. *Retzia* 1: 166. 1855, et Hort. Bog. S. Retziae ed. nova 52. 1858; Muell. Arg. in DC. Prodr. 15(2): 240. 1866; Back. et Bakh. f. Fl. Java 1: 471. 1963; Airy Shaw in Dansk Bot. Arkiv 25(2): 34, fig. 13. 1967, in Kew Bull. 26(2): 336. 1972, et 35(3): 681. 1980, et in Kew Bull. Add. Ser. 4: 193. 1975; Whitmore, Tree Fl. Malaya 2: 131. 1973; P. T. Li in Acta Phytotax. Sin. 25: 133. 1987; non Villar (1877). —*Sauropus spectabilis* Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 446. 1861. —*S. macrophyllus* Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 333. 1887, pro parte; Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. 81(IV. 147. XV): 226. 1921, pro parte. —*S. grandifolius* Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. 81(IV. 147. XV): 220. 1921. —*S. longipedicellatus* Merr. et Chun in Sunyatsenia 2: 34. 1934; 海南植物志 2: 136, fig. 362. 1965.

灌木,高3—4米;小枝略具棱;全株无毛。叶片纸质,卵状长圆形、卵状椭圆形或椭圆状披针形,长4—20厘米,宽3.5—8厘米,顶端短渐尖,基部楔形至圆;侧脉每边6—10条,近扁平;叶柄长2.5—7毫米;托叶三角状披针形,长3—6毫米,灰褐色。雌雄同株;雄花:花梗长2—6.5毫米;花萼盘状,直径3.5—4.5毫米,有红色线斑,顶端浅6—8裂;花盘腺体6—8,与萼片对生;雌花:单生或几朵与雄花簇生于叶腋内;花梗长2—6厘米,结果时长9—13厘米;花萼黄绿色,6深裂,裂片稍厚,组成2轮,外轮的倒卵形或近匙形,卵状椭圆形,长6—7毫米,宽3—4毫米,内轮的较短,倒卵形,长约5毫米,具紫红色条纹;无花盘;雌蕊扁球状,高2毫米,宽2.7毫米,子房3室,花柱3,顶端2裂。蒴果近球状或扁球状,直径1.5—2.5厘米,高约1.5厘米,红色或红棕色;宿存萼片倒卵形,具爪,长约1厘米;花柱宿存。

产于广东、海南和云南(思茅、西双版纳、金屏等地),生于海拔500—1500米山地阔叶林下或山谷灌木丛中。分布自印度东北部,经过亚洲东南部、马来西亚至澳大利亚的北部。模式标本采自印度尼西亚的爪哇。

7. 多脉守宫木(植物分类学报) 图版 51: 3

Sauropus yanhuianus P. T. Li in Acta Phytotax. Sin. 25: 134. 1987.

灌木,高约1.5米;枝条具棱,灰青色;全株无毛。叶片薄纸质,长圆形或长圆状披针



1—2.网脉守宫木 *Sauropus reticulatus* X. L. Mo ex P. T. Li: 1.果枝; 2.蒴果。3.多脉守宫木 *S. yashuiianus* P. T. Li: 雌花枝。4.长梗守宫木 *S. macranthus* Hassk.: 4.果枝。(黄少容绘)