

厘米,宽4—5厘米,顶端渐尖,基部宽楔形至钝;侧脉每边8—10条,与网脉两面均明显,且微凸起;叶柄长约5毫米;托叶三角形,常早落。蒴果扁球状,直径约2厘米,高约1.5厘米,单生于叶腋;果梗长约3厘米;宿存萼片6,宽倒卵形,长约5毫米,宽2.5毫米,较厚,宿存的花柱3,分离,顶端2裂。

产于广西靖西和云南泸西等地,生于海拔500—800米石灰岩山地疏林下或山坡灌木丛中。模式标本采自广西靖西。

6. 长梗守宫木(海南植物志) 图版 51: 4

Sauropus macranthus Hassk. *Retzia* 1: 166. 1855, et Hort. Bog. S. Retziae ed. nova 52. 1858; Muell. Arg. in DC. Prodr. 15(2): 240. 1866; Back. et Bakh. f. Fl. Java 1: 471. 1963; Airy Shaw in Dansk Bot. Arkiv 25(2): 34, fig. 13. 1967, in Kew Bull. 26(2): 336. 1972, et 35(3): 681. 1980, et in Kew Bull. Add. Ser. 4: 193. 1975; Whitmore, Tree Fl. Malaya 2: 131. 1973; P. T. Li in Acta Phytotax. Sin. 25: 133. 1987; non Villar (1877). — *Sauropus spectabilis* Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 446. 1861. — *S. macrophyllus* Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 333. 1887, pro parte; Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. 81(IV. 147. XV): 226. 1921, pro parte. — *S. grandifolius* Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. 81(IV. 147. XV): 220. 1921. — *S. longipedicellatus* Merr. et Chun in Sunyatsenia 2: 34. 1934; 海南植物志 2: 136, fig. 362. 1965.

灌木,高3—4米;小枝略具棱;全株无毛。叶片纸质,卵状长圆形、卵状椭圆形或椭圆状披针形,长4—20厘米,宽3.5—8厘米,顶端短渐尖,基部楔形至圆;侧脉每边6—10条,近扁平;叶柄长2.5—7毫米;托叶三角状披针形,长3—6毫米,灰褐色。雌雄同株;雄花:花梗长2—6.5毫米;花萼盘状,直径3.5—4.5毫米,有红色线斑,顶端浅6—8裂;花盘腺体6—8,与萼片对生;雌花:单生或几朵与雄花簇生于叶腋内;花梗长2—6厘米,结果时长9—13厘米;花萼黄绿色,6深裂,裂片稍厚,组成2轮,外轮的倒卵形或近匙形,卵状椭圆形,长6—7毫米,宽3—4毫米,内轮的较短,倒卵形,长约5毫米,具紫红色条纹;无花盘;雌蕊扁球状,高2毫米,宽2.7毫米,子房3室,花柱3,顶端2裂。蒴果近球状或扁球状,直径1.5—2.5厘米,高约1.5厘米,红色或红棕色;宿存萼片倒卵形,具爪,长约1厘米;花柱宿存。

产于广东、海南和云南(思茅、西双版纳、金屏等地),生于海拔500—1500米山地阔叶林下或山谷灌木丛中。分布自印度东北部,经过亚洲东南部、马来西亚至澳大利亚的北部。模式标本采自印度尼西亚的爪哇。

7. 多脉守宫木(植物分类学报) 图版 51: 3

Sauropus yanhuianus P. T. Li in Acta Phytotax. Sin. 25: 134. 1987.

灌木,高约1.5米;枝条具棱,灰青色;全株无毛。叶片薄纸质,长圆形或长圆状披针

形,长 10—14 厘米,宽 3—4 厘米,顶端渐尖,基部宽楔形;中脉和侧脉两面凸起,中脉基部及叶片基部边缘密被鳞片,侧脉每边 10—12 条,斜升至叶缘前弯拱连结;叶柄长约 3 毫米;托叶三角形,长 1.5 毫米。雌雄异株;雌花 1—2 朵腋生;花梗长 6—10 毫米,上部膨大,基部有小苞片;花萼黄绿色,6 深裂,萼片长倒卵形,长 2.5—4 毫米,宽 1.5—3 毫米,覆瓦状排列;子房圆球状,直径约 3.5 毫米,3 室,每室 2 胚珠,花柱 3,分离,短。花期 6 月。

产于云南沧源南蜡,生于海拔 1 000—1 100 米山地沟谷密林下。模式标本采自沧源南蜡。

8. 盈江守宫木(植物分类学报) 图版 52:1—4

Sauropus pierrei (Beille) Croiz. in Journ. Arn. Arb. 21: 494. 1940; Airy Shaw in Kew Bull. 23: 55. 1969, et Kew Bull. Add. Ser. 4: 194. 1975; P. T. Li in Acta Phytotax. Sin. 25: 134. 1987. —*Breyniopsis pierrei* Beille in Lec. Fl. Gén. Indo-Chiné 5: 630, fig. 75 (1—9). 1927; Pax et Hoffm. in Engl. et Harms, Pflanzenr. ed. 2, 19c: 59. 1931.

灌木,高 1—4 米;茎皮淡褐色,具皱纹;枝条圆柱形,幼时具棱;全株均无毛。叶片纸质或厚纸质,卵状披针形或长圆状披针形,长 7.5—10.5 厘米,宽 2.5—3.5 厘米,顶端渐尖,基部渐狭至钝,上面深绿色,下面灰绿色;中脉下面凸起,侧脉每边 5—8 条,两面稍凸起;叶柄长 3—4 毫米;托叶卵状披针形,长约 2 毫米。雌雄同株;雄花:簇生于叶腋内,花梗长 3—4 毫米,纤细,中部以下着生有许多覆瓦状排列的小苞片;小苞片膜质;萼片 6,宽卵形或斜卵形,长约 1.5 毫米,宽约 2 毫米;雄蕊 3,花丝中部以下合生呈圆柱状,花药卵形;雌花 1—2 朵腋生,花梗长约 5 毫米;萼片 6,卵形,长约 2 毫米;子房卵状,长约 1.5 毫米,花柱 3,分离,顶端 2 裂,裂片下弯。蒴果圆球状,直径 1—1.5 厘米,花萼和花柱通常宿存。花期 6—9 月,果期 9—11 月。

产于云南(盈江等),生于海拔 200—300 米山地疏林下。分布于越南、老挝、柬埔寨。模式标本采自越南。

9. 尾叶守宫木(植物分类学报) 图版 52:5—10

Sauropus tsiangii P. T. Li in Acta Phytotax. Sin. 25: 135. 1987.

灌木,高约 1 米;茎圆柱状;小枝具棱;全株无毛。叶片纸质,卵形至卵状披针形,长 6.5—9.5 厘米,宽 3.5—4.5 厘米,顶端尾状渐尖,基部圆;中脉两面凸起,侧脉每边 6—7 条,上面扁平,下面凸起;叶柄长 3—4 毫米;托叶早落。雌雄同株,通常 3 花簇生于叶腋内;花梗丝状,长 5—8 毫米;雄花:萼片 6,长圆状披针形,长约 2 毫米;花盘腺体 6,半圆形,比萼片短 2/3,且与萼片对生;雄蕊 3,花丝中部以下合生,花药外向,长圆形,2 室,纵裂;雌花:萼片 6,匙形,长约 5 毫米,顶端钝;子房扁三棱状,直径约 2 毫米,3 室,每室 2 胚珠,花柱 3,顶端 2 裂,裂片下弯。

产于广西龙州等地,生于石灰岩山地林下。模式标本采自龙州水口。



1—2.网脉守宫木 *Sauropus reticulatus* X. L. Mo ex P. T. Li: 1.果枝; 2.蒴果。3.多脉守宫木 *S. yashuiianus* P. T. Li: 雌花枝。4.长梗守宫木 *S. macranthus* Hassk.: 4.果枝。(黄少容绘)