

形,长 10—14 厘米,宽 3—4 厘米,顶端渐尖,基部宽楔形;中脉和侧脉两面凸起,中脉基部及叶片基部边缘密被鳞片,侧脉每边 10—12 条,斜升至叶缘前弯拱连结;叶柄长约 3 毫米;托叶三角形,长 1.5 毫米。雌雄异株;雌花 1—2 朵腋生;花梗长 6—10 毫米,上部膨大,基部有小苞片;花萼黄绿色,6 深裂,萼片长倒卵形,长 2.5—4 毫米,宽 1.5—3 毫米,覆瓦状排列;子房圆球状,直径约 3.5 毫米,3 室,每室 2 胚珠,花柱 3,分离,短。花期 6 月。

产于云南沧源南蜡,生于海拔 1 000—1 100 米山地沟谷密林下。模式标本采自沧源南蜡。

8. 盈江守宫木(植物分类学报) 图版 52:1—4

Sauropus pierrei (Beille) Croiz. in Journ. Arn. Arb. 21: 494. 1940; Airy Shaw in Kew Bull. 23: 55. 1969, et Kew Bull. Add. Ser. 4: 194. 1975; P. T. Li in Acta Phytotax. Sin. 25: 134. 1987. —*Breyniopsis pierrei* Beille in Lec. Fl. Gén. Indo-Chiné 5: 630, fig. 75 (1—9). 1927; Pax et Hoffm. in Engl. et Harms, Pflanzenr. ed. 2, 19c: 59. 1931.

灌木,高 1—4 米;茎皮淡褐色,具皱纹;枝条圆柱形,幼时具棱;全株均无毛。叶片纸质或厚纸质,卵状披针形或长圆状披针形,长 7.5—10.5 厘米,宽 2.5—3.5 厘米,顶端渐尖,基部渐狭至钝,上面深绿色,下面灰绿色;中脉下面凸起,侧脉每边 5—8 条,两面稍凸起;叶柄长 3—4 毫米;托叶卵状披针形,长约 2 毫米。雌雄同株;雄花:簇生于叶腋内,花梗长 3—4 毫米,纤细,中部以下着生有许多覆瓦状排列的小苞片;小苞片膜质;萼片 6,宽卵形或斜卵形,长约 1.5 毫米,宽约 2 毫米;雄蕊 3,花丝中部以下合生呈圆柱状,花药卵形;雌花 1—2 朵腋生,花梗长约 5 毫米;萼片 6,卵形,长约 2 毫米;子房卵状,长约 1.5 毫米,花柱 3,分离,顶端 2 裂,裂片下弯。蒴果圆球状,直径 1—1.5 厘米,花萼和花柱通常宿存。花期 6—9 月,果期 9—11 月。

产于云南(盈江等),生于海拔 200—300 米山地疏林下。分布于越南、老挝、柬埔寨。模式标本采自越南。

9. 尾叶守宫木(植物分类学报) 图版 52:5—10

Sauropus tsiangii P. T. Li in Acta Phytotax. Sin. 25: 135. 1987.

灌木,高约 1 米;茎圆柱状;小枝具棱;全株无毛。叶片纸质,卵形至卵状披针形,长 6.5—9.5 厘米,宽 3.5—4.5 厘米,顶端尾状渐尖,基部圆;中脉两面凸起,侧脉每边 6—7 条,上面扁平,下面凸起;叶柄长 3—4 毫米;托叶早落。雌雄同株,通常 3 花簇生于叶腋内;花梗丝状,长 5—8 毫米;雄花:萼片 6,长圆状披针形,长约 2 毫米;花盘腺体 6,半圆形,比萼片短 2/3,且与萼片对生;雄蕊 3,花丝中部以下合生,花药外向,长圆形,2 室,纵裂;雌花:萼片 6,匙形,长约 5 毫米,顶端钝;子房扁三棱状,直径约 2 毫米,3 室,每室 2 胚珠,花柱 3,顶端 2 裂,裂片下弯。

产于广西龙州等地,生于石灰岩山地林下。模式标本采自龙州水口。



1—4. 盈江守宫木 *Sauropus pierrei* (Beille) Criez.: 1. 花果枝; 2. 雄花; 3. 花盘和雄蕊; 4. 幼果。
5—10. 尾叶守宫木 *S. tsiangii* P. T. Li.: 5. 花枝; 6. 雄花; 7. 花盘和雄蕊; 8. 雌花; 9. 雌花的萼片;
10. 子房横切面, 示胚珠着生。(黄少容绘)