

17. 黑面神属*——*Breynia* J. R. et G. Forst. nom. cons.

J. R. et G. Forst. Charact. Gen. 145, tab. 73. 1776; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 3: 276. 1880; non Linn. (1737). — *Foersteria* Scop. Introd. 98. 1777. — *Forsteria* Steud. Nom. ed. 1: 344. 1821. — *Melanthesa* Bl. Bijdr. 590. 1825. — *Melanthesopsis* Muell. Arg. in Linnaea 32: 74. 1863. — *Melanthesopsis* Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 3: 277. 1880.

灌木或小乔木。单叶互生，二列，全缘，干时常变黑色，羽状脉，具有叶柄和托叶。花雌雄同株，单生或数朵簇生于叶腋，具有花梗；无花瓣和花盘；雄花：花萼呈陀螺状、漏斗状或半球状，顶端边缘通常6浅裂或细齿裂；雄蕊3，花丝合生呈柱状，花药2室，纵裂；无退化雌蕊；雌花：花萼半球状、钟状至辐射状，6深裂或6浅裂，稀5浅裂，结果时常增大而呈盘状；子房3室，每室有胚珠2颗，花柱3，顶端通常2裂。蒴果常呈梨果状，不开裂，外果皮多少肉质，干后常变硬，具有宿存的花萼；种子三棱状，一面狭而稍凸起，其余两面宽而平，种皮薄，无种阜，胚乳丰富，肉质，胚弯曲，子叶略宽而扁。染色体基数 $x = 13$ 。

本属模式种：二列黑面神 *Breynia disticha* J. R. et G. Forst.

约26种，主要分布于亚洲东南部，少数在澳大利亚及太平洋诸岛。我国产5种，分布于西南部、南部和东南部。

分 种 检 索 表

1. 萼片6。
 2. 小枝圆柱状；叶片膜质，无小斑点和鳞片……………1. 小叶黑面神 *B. vitis-idaea* (Burm. f.) C. E. C. Fischer
 2. 小枝四棱或扁压状；叶片革质至纸质，密被小斑点或小鳞片。
 3. 小枝四棱；叶片小，长达2.5厘米，宽7—15毫米，仅叶缘密被小斑点或小鳞片，干时灰色……………2. 钝叶黑面神 *B. retusa* (Dunnst.) Alston
 3. 小枝扁压状；叶片长3—7厘米，宽1.5—3.5厘米，均匀地被小斑点，干时变黑色。
 4. 叶片革质，顶端钝或急尖；雌花花萼钟状，顶端6浅裂，裂片近相等，结果时增大，上部辐射状张开呈盘状；蒴果顶端无圆锥状的喙……………3. 黑面神 *B. fruticosa* (Linn.) Hook. f.
 4. 叶片纸质或近革质，顶端渐尖；雌花花萼6深裂，其中3片较大，结果时不增大而反折；蒴果顶端有宿存喙状的花柱……………4. 喙果黑面神 *B. rostrata* Merr.
1. 萼片5；叶片椭圆形；侧脉不明显；雄花萼片圆形，花梗长达1.5厘米……………5. 广西黑面神 *B. hyposauropa* Croiz.

* 黑面神属(中国种子植物科属辞典)，别名：山漆茎属(植物学名词审查本)。